

BIOAKTIVITAS JAMUR Aspergillus flavus YANG BERSIMBION

by Deiske Sumilat 56

Submission date: 26-Sep-2020 05:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1397591994

File name: 2020-BIOAKTIVITAS_JAMUR_Asp ergillus_flavus_YANG_BERSIMBION.pdf (768.29K)

Word count: 3810

Character count: 22826

BIOAKTIVITAS JAMUR *Aspergillus flavus* YANG BERSIMBION DENGAN ASCIDIAN *Eudistoma* sp.

(BIOACTIVITY OF MARINE DERIVED SYMBIOTIC FUNGUS *Aspergillus flavus* FROM ASCIDIAN *Eudistoma* sp.)

Alfa Mongi^{1*}, Deiske A. Sumilat¹, Fitje Losung¹, Remy E.P. Mangindaan¹,
Rosita A. J. Lintang¹, Suzanne L. Undap²

21

¹Program Studi Ilmu Kelautan, FPIK, UNSRAT

²Program Studi Budidaya Perairan, FPIK, UNSRAT

*E-mail : deiske.sumilat@gmail.com

Abstract

10 Ascidian is a marine invertebrate that produce bioactive compounds such as antibacterial and antifungal. The purpose of this study was to obtain symbiotic fungi isolates, ethyl acetate extracts from ascidian symbiotic isolates, and to determine the antibacterial and antifungal activities of ethyl acetate extracts of symbiotic isolates using the diffusion method (disc diffusion Kirby and Bauer) against *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* bacteria and against the *Candida albicans* fungus. The results obtained 1 ascidian species which was cultured to obtain pure isolates, the pure isolates were tested molecularly and the results showed that the isolate was *Aspergillus flavus*, then the isolates were grown on rice medium and extracted. The results of the fungal extract showed the presence of antibacterial and antifungal activity against *Escherichia coli* by 10 mm, *Staphylococcus aureus* by 19 mm and against the *Candida albicans* by 13.5 mm.

Keywords : Ascidian, *Eudistoma* sp., *Aspergillus flavus*, Antibacterial, Antifungal, Symbiotic.

Abstrak

31

Ascidian merupakan invertebrata laut yang dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang seperti antibakteri dan antijamur. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan isolat jamur simbion dari ascidian, mendapatkan ekstrak etil asetat dari isolat jamur simbiotik ascidian, dan menguji aktivitas antibakteri dan antijamur ekstrak etil asetat isolat jamur simbion dengan metode difusi agar (disc diffusion Kirby and Bauer) terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* dan terhadap jamur *Candida albicans*. Hasil penelitian didapatkan 1 jenis ascidian yang kemudian dikultur untuk mendapatkan isolat murni, isolat murni diuji secara molekuler dan didapat hasil bahwa isolat tersebut merupakan jamur *Aspergillus flavus*. Isolat tersebut kemudian ditumbuhkan pada media nasi dan diekstrak. Hasil ekstrak jamur tersebut menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dan antijamur terhadap bakteri *Escherichia coli* sebesar 10 mm, *Staphylococcus aureus* sebesar 19 mm dan terhadap jamur *Candida albicans* 13,5 mm.

Kata kunci : Ascidian, *Eudistoma* sp., *Aspergillus flavus*, Antibakteri, Antijamur, Simbion.

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia memiliki wilayah perairan lebih luas dari daratan. Hal ini membuat perairan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi yang seharusnya dapat dijadikan sebagai objek pengembangan dan penelitian, mengingat banyaknya sumber daya alam potensial yang belum sepenuhnya terkuak. Keanekaragaman organisme (*biodiversity*) laut juga mempunyai arti keanekaragaman senyawa kimia (*chemodiversity*) yang terkandung dalam organisme. Senyawa-senyawa tersebut dapat memiliki aktivitas biologis yang bervariasi. Bahan alam laut berupa senyawa-senyawa kimia tersebut berpotensi dikembangkan sebagai bahan obat. Beberapa biota laut yang diketahui dapat menghasilkan bahan hayati yang memiliki aktivitas biologis di antaranya yaitu bryozoa, spons, moluska dan ascidian (Proksch *et al.*, 2002).

Penelitian terhadap ascidian telah berkembang dengan baik, yang mengarah pada isolasi berbagai metabolit yang memiliki struktur yang unik dan senyawa bioaktivitas yang besar. Hal ini membuat ascidian memiliki potensi sebagai sumber obat-obatan alami untuk mengobati berbagai penyakit, produk yang dihasilkan seperti larvasida, sitotoksik, antijamur, antikanker, antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri (Ali dan Tamilselvi, 2016; Donia *et al.*, 2008; Wang *et al.*, 2008; Rumengen, 2010; Chan *et al.*, 2011; Macpal *et al.*, 2019; Losung *et al.*, 2015; Mangindaan dan Taroreh, 2013; Moerid *et al.*, 2013; Opa *et al.*, 2018; Wewengkang *et al.*, 2014). Reddy *et al.* (2011), jumlah metabolit sekunder yang diisolasi dari jamur laut yang bersimbiosis dengan alga, sponge, ascidian, dan organisme lainnya sebagai antibakteri, antijamur, dan sitotoksik rata-rata 75% memiliki aktivitas biologis.

Sumilat *et al.*, (2017), produk alami yang diperoleh dari organisme laut semakin mendapat perhatian karena substansi bioaktif yang terkandung di dalamnya berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai

bahan obat-obatan. Oleh sebab itu, eksplorasi jamur simbion dari ascidian perlu dilakukan. Selain itu, berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur pada saat ini semakin banyak dan diperlukan pencarian senyawa antibakteri dan antijamur yang baru.

Adapun dalam penelitian ini pengujian antibakteri dan antijamur menggunakan mikroba uji yaitu bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* dan jamur *Candida albicans*. *E. coli* merupakan bakteri gram negatif yang ditemukan dalam saluran pencernaan hewan ²⁴ dan manusia (Melliawatri, 2009). *S. aureus* merupakan bakteri gram positif bakteri yang pada manusia bakteri ini bersifat pathogen (Warsa, 1994). Sendangkan jamur *C. albicans* merupakan jamur yang kandidiasis atau kandidosis yaitu suatu penyakit jamur yang bersifat akut dan sub-akut yang dapat mengenai mulut, vagina, kulit, kuku, paruparu dan saluran pencernaan (Jawetz *et al.*, 2016).

Lokasi penelitian Perairan Pangalingsang Bunaken Sulawesi Utara memiliki alam bawah laut yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati sehingga perlu dilakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap metabolit sekunder yang dihasilkan oleh ascidian, dalam penelitian ini organisme ascidian diisolasi untuk mendapatkan isolat jamur simbion, selanjutnya jamur simbion tersebut dikultur pada media nasi dan diekstraksi untuk diuji aktivitas antibakteri dan antijamur dengan menggunakan metode difusi agar.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat pengambilan sampel pada Perairan Pangalinsang ³⁴naken, kemudian penelitian dilanjutkan di Laboratorium Biologi Molekuler dan Farmasi Laut, FPIK UNSRAT untuk kegiatan isolasi sampel, kultur jamur, ekstraksi, serta pengujian aktivitas antibakteri dan anti jamur.

Pengambilan Sampel Ascidian

Sampel ascidian diperoleh dari perairan Pangalisang Bunaken dengan cara menyelam (*diver*) dengan menggunakan 1 set alat *snorkeling* (*skin diver*) pada kedalaman ± 3-7 meter.

¹⁴ Sampel diambil dengan cara memotong organisme ascidian langsung dari substratnya, kemudian sampel dimasukkan ke dalam plastik sampel bersih. Sampel selanjutnya dibawa ke Laboratorium Biologi Molekuler dan Farmasetika Laut Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT.

Media Potato Dextrose Agar (PDA)

Media PDA adalah media untuk menumbuhkan jamur. Media PDA 3,9 gram, dimasukkan dalam labu erlenmeyer dan dilarutkan dalam air laut saring sebanyak 100 ml. Media disterilkan dengan di dalam autoklaf pada suhu 121°C selama ± 20 menit, kemudian diaduk dengan cara mengoyangkan dengan cara perlahan dan dituang ke dalam cawan petri.

Isolasi Jamur Yang Bersimbion Dengan Ascidian

Sampel diisolasi dengan cara ditanam pada media padat PDA yang sudah disiapkan sebelumnya. Inokulasi dilakukan di dalam *Laminary Air Flow* dengan cara sampel ascidian dipotong kecil-kecil menggunakan pisau steril dan ditanam ke dalam cawan petri dengan menggunakan pinset steril. Cawan petri dibungkus dengan menggunakan lakban kertas (*masking tape*) dan diinkubasi pada suhu ruangan selama 3x24 jam.

Setelah 3x24 jam, maka akan didapat jamur yang mulai bertumbuh di sekitaran sampel ascidian. Jamur-jamur tersebut kemudian dipurifikasi. Kegiatan purifikasi dilakukan di dalam *Laminary Air Flow* dengan cara mengambil jamur yang tumbuh pada ascidian dengan pisau dan jarum ose yang telah dibakar pada lampu bunsen, kemudian ditanam pada media PDA

⁴¹

yang baru, kegiatan ini dilakukan beberapa kali dengan cara yang sama.

Pembuatan Media Nasi

Media nasi dibuat dengan menggunakan beras (superwin). Beras sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam labu erlemeyer, dan tambahkan air laut saring sebanyak 60 ml., ditutup dan dibungkus dengan *aluminum foil* kemudian dimasak-steril dengan autoklaf pada suhu 121°C selama ± 20 menit. Setelah itu media nasi diinkubasi pada suhu ruangan selama 5x24 jam (Kjer et al., 2010).

Kultur Isolat Murni Jamur Simbion di Media Nasi

Ketika jamur yang dikultur pada media PDA sudah homogen, dipotong berbentuk kubus dan dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer yang mengandung media nasi kemudian ditutup dengan kapas. Media nasi diinkubasi pada suhu ruangan selama 14x24 jam (Kjer et al., 2010).

Ekstraksi Jamur Simbion Dari Ascidian Dengan Etil Asetat

Ekstraksi jamur simbion dari ascidian dilakukan berdasarkan metode ekstraksi yang mengacu pada metode Kjer et al., (2010), dengan beberapa modifikasi. Jamur yang sudah bertumbuh di media nasi dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan pengaduk kaca, kemudian dimerasasi menggunakan pelarut etil asetat sebanyak 3x 100 ml. Hasil maserasi dievaporasi menggunakan *rotary vacuum evaporator* pada suhu 40° C hingga diperoleh ekstrak etil asetat.

Pengujian Antibakteri dan Antijamur Ekstrak Kasar Jamur Simbion Fraksi Etil Asetat

³⁹

Sterilisasi Alat dan Media

Sterilisasi alat-alat dan media yang digunakan pada pengujian antibakteri ini seperti cawan petri, gelas erlenmeyer, dan tabung reaksi semuanya dicuci bersih,

dikeringkan dan dibungkus dengan kertas lalu dimasukkan ke dalam oven pada suhu 160°C selama kurang lebih 2 jam (sterilisasi kering). Sedangkan untuk alat lainnya seperti tip mikropipet yang berada dalam kotak plastik steril, langsung dibungkus dengan *alumunium foil*.

4

Pembuatan Media cair B1

Media cair B1 dibuat untuk mengkultur mikroba uji. Pepton 0,5 g, *beef extract* 0,3 g, natrium klorida 0,3 g dan akuades banyak 100 ml diaduk sampai homogen kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dan setelah itu ³⁸ inginkan. Setelah dingin, media cair B1 ditutup dengan *alumunium foil* dan diinkubasi pada suhu ruangan selama 1x24 jam.

Kultur Mikroba Uji

Mikroba yang digunakan yaitu *E. coli*, *S. aureus* dan *C. albicans*. *E. coli* dan *S. aureus* diambil dengan menggunakan jarum ose steril dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi media cair B1. Sedangkan *C. albicans* diambil dari biakan murni menggunakan mikropipet sebanyak 100 µL dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang sudah berisi media cair B1 sebanyak 1 ml dan kemudian ditutup menggunakan *aluminiu* foil. Setelah itu, diinkubasi pada suhu ruangan selama 1x24 jam.

7

Pembuatan Media Uji

Media uji yang digunakan yaitu media B1 (padat) dengan komposisi pepton 0,5 g, *beef extract* 0,3 g, natrium klorida 0,3 g agar 1,5 dan akuades sebanyak 100 ml. Setelah itu ditutup dan dibungkus dengan kertas *alumunium foil* lalu media uji tersebut diaduk sampai homogen kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Selanjutnya media ditunggu sampai hangat lalu masukkan mikroba yang telah dikultur pada media cair B1 menggunakan mikropipet berukuran 1000 µL kemudian ditutup kembali menggunakan *alumunium foil* dan diaduk

4

dengan perlahan, dan dituang ke dalam cawan petri steril.

10

Kontrol Positif Dan Kontrol Negatif

Uji aktivitas antibakteri, menggunakan kontrol positif yaitu 250 mg kloramfenikol yang dilarutkan dalam 250 ml aquades, dan sebagai kontrol negatif menggunakan pelarut etil asetat, sedangkan untuk uji aktivitas antijamur pembuatan kontrol positif yaitu 250 mg ketoconazole dilarutkan dalam 250 ml aquades, dan sebagai kontrol negatif menggunakan pelarut etil asetat.

Uji Aktifitas Antibakteri dan Antijamur Isolat Murni Jamur Simbion

Pengujian dilakukan dengan konsentrasi ekstrak kasar jamur simbion 100 mg/ml, kloramfenikol, kotozonasole dan etil asetat, akan diambil masing-masing 50 µL menggunakan mikropipet yang ditotolkan pada kertas cakram berukuran 6 mm dengan ¹⁸ya serap 100 µL tiap kertas cakram dimasukkan ke dalam wadah steril yang telah diberi tanda (Wikler et al., 2009).

32

Pengamatan dan Pengukuran

Pengamatan dilakukan setelah 1x24 jam masa inkubasi. Hasil data pengukuran yang diperoleh berupa diameter zona bening dari ekstrak jamur diukur menggunakan mistar dan dibandingkan dengan zona bening kontrol positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel ascidian yang diperoleh saat sampling kemudian diidentifikasi dengan mengamati morfologinya dan dibantu dengan buku pedoman Colin dan Arneson (1995). Hasil identifikasi diketahui bahwa ascidian tersebut merupakan spesies *Eudistoma* sp. Ciri-ciri ascidian *Eudistoma* sp. adalah berbentuk tebal, berwarna cokelat, dan berbintik-bintik. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan sampel ascidian yang diperoleh dari perairan Pangalisang, Bunaken.



Gambar 1. Ascidian *Eudistoma* sp.

Isolasi dan Kultur Jamur Simbion Ascidian *Eudistoma* sp.

Setelah didisolasi dan diinkubasi selama 2x24 jam, pada bagian sekitar sampel terlihat munculnya bercak berwarna putih. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan dari jamur yang bersimbiosis dengan ascidian *Eudistoma* sp. Jamur yang tumbuh tersebut kemudian langsung diisolat dengan tujuan untuk mendapatkan isolat jamur yang murni. Isolat jamur dikultur banyak dua kali sehingga didapatkan isolat jamur yang murni.



Gambar 2. Isolat Murni Jamur Simbion *Eudistoma* sp. (ABU2 2 .1.)

Isolat murni yang diperoleh (ABU2 2.1.) kemudian isolat tersebut diidentifikasi DNA-nya untuk mengetahui jenis jamur apa yang bersimbiosis dengan ascidian *Eudistoma* sp. Jamur simbion diidentifikasi secara molekuler di Lab. Genetika Science Jakarta, didapatkan hasil bahwa jamur yang

bersimbiosis dengan *Eudistoma* sp. 5,8s ribosomal RNA gene adalah jamur *Aspergillus flavus* dengan keakuratan 100 persen. *Aspergillus flavus* adalah salah satu eukariota jamur paling umum ditemui. *Aspergillus flavus* dapat memproduksi aflatoksin. Aflatoksin adalah toksin (racun) yang dapat menyebabkan pertumbuhan ikan akan terganggu, juga dapat menyebabkan aspergillosis pada manusia dan hewan, dan sebagai patogen oportunistik hewan dan tumbuhan (Ramirez-Camejo *et al.*, 2012).

Eksraksi Jamur Simbion Ascidian

Isolat jamur yang telah dikultur pada media nasi kemudian dimaserasi menggunakan etil asetat sebanyak 3 x 100 ml. kemudian dievaporasi menggunakan alat *Rotary vacuum evaporator*.

Pengujian Antibakteri dan Antijamur dari Eksrak Kasar Isolat Murni Jamur Simbion Ascidian

Aktivitas antibakteri diamati dengan adanya zona hambat pada sekitar kertas cakram. Pengamatan dan pengukuran zona hambat menggunakan mist dilakukan pada media mikroorganisme uji *E. coli*, *S. aureus*, dan *C. albicans*. Pengamatan hasil uji aktivitas antibakteri dilakukan 2x24 jam untuk mengetahui efek antimikroba yang terjadi pada masing-masing isolat jamur.


Berikut hasil pengamatan 1x24 jam uji aktivitas antibakteri dan. Hasilnya pada media bakteri *E. coli* (Gambar 3 dan Tabel 1). Ekstrak isolat jamur dan kontrol positif menunjukkan adanya zona hambat sebesar 10 mm dan kontrol posisi sebesar 28,5 mm.

Pada media bakteri *S. aureus* (Gambar 3 dan Tabel 1) ekstrak isolat jamur dan kontrol positif menunjukkan adanya zona hambat sebesar 19 mm, kontrol positif sebesar 25,5 mm. Pada media jamur *C. albicans* hanya ekstrak isolat jamur yang menunjukkan adanya zona hambat sebesar 13,5 mm.

Hasil pengamatan 2x24 jam uji aktivitas antibakteri dan antijamur pada media bakteri *E. coli* (Gambar 4 dan Tabel 1) hanya ekstrak isolat jamur yang

menunjukkan adanya zona hambat sebesar 7,5 mm.

Pada media bakteri *S. aureus* (Gambar 4 dan Tabel 1) ekstrak isolat jamur menunjukkan adanya zona hambat sebesar 16 mm, dan kontrol positif sebesar 23,5 mm. Dan pada media jamur *C. albicans* hanya ekstrak isolat jamur yang menunjukkan adanya zona hambat sebesar 13,5 mm.



Gambar 3. A, B, C Hasil uji aktivitas antibakteri dan antijamur pengamatan 1x24 jam pada media mikroorganisme uji *E. coli*, *S. aureus* dan *C. albicans*.

coli, *S. aureus* dan *C. albicans*



Gambar 4. D, E, F Hasil uji aktivitas antibakteri dan antijamur pengamatan 2x24 jam pada media mikroorganisme uji *E. coli*, *S. aureus* dan *C. albicans*.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Dari Isolat Jamur Simbion Fraksi Etil Asetat Terhadap Bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* dan Jamur *Candida albicans*

Mikroorganisme Uji	Isolat ABU2 2.1. (Zona hambat mm)	
	Pengamatan 1x24 Jam	Pengamatan 2x24 jam
<i>E. coli</i>	10	7,5
<i>S. aureus</i>	19	16
<i>C. albicans</i>	13,5	13,5
Kontrol		
Bakteri Uji <i>E. coli</i>		
Kloramfenikol (+)	28,5	-
Etil Asetat (-)	-	-
Bakteri Uji <i>S. aureus</i>		
Kloramfenikol (+)	25,5	23,5
Etil Asetat (-)	-	-
Jamur uji <i>C. albicans</i>		
Ketoconazole (+)	-	-
Etil Asetat (-)	-	-

Menurut Davis dan Stout (1971) penggolongan kriteria¹⁷ kekuatan suatu bahan antibakteri, yakni diameter zona hambat 5 mm atau kurang dikategorikan lemah, dan zona hambat 5-10 mm dikategorikan sedang, sedangkan diameter zona hambat 10-20 mm dikategorikan kuat dan bahkan yang melebihi dari 20 mm dikategorikan sangat kuat.

Dari Tabel 1 pada pengamatan 1x24 jam ditunjukkan hasil yaitu bakteri *E. coli* menghasilkan penghambatan sebesar 10 mm. Pada bakteri *S. aureus* menghasilkan penghambatan sebesar 19 mm. Pada jamur *C. albicans* menghasilkan penghambatan sebesar 13,5 mm. Dari hasil uji aktivitas yang diperoleh maka diketahui bahwa isolat 8 / ABU2 2.1. pada pengamatan 1x24 jam memiliki aktivitas antimikroba yang tergolong kuat.

Dari Tabel 1 pada pengamatan³⁵ 24 jam menunjukkan hasil yang berbeda pada bakteri *E. coli* dan bakteri *S. aureus* dibandingkan dengan pengamatan pada 1x24 jam, sementara pada jamur *C. albicans* tetap sama. Pada bakteri *E. coli* menghasilkan penghambatan sebesar 7,5 mm. Pada bakteri *S. aureus* menghasilkan penghambatan sebesar 16 mm. Pada jamur *C. albicans* menghasilkan penghambatan sebesar 13,5 mm. Dari hasil uji aktivitas yang diperoleh maka diketahui bahwa isolat 8 / ABU2 2.1. pada pengamatan 2x24 jam memiliki aktivitas antimikroba yang tergolong kuat dan sedang.

Pada penelitian ini, isolat jamur simbion dari *Eudistoma* sp. menunjukkan adanya^{b6} aktivitas yang berpotensi membunuh bakteri *E. coli*, *S. aureus*, dan jamur *C. albicans*. Ini dikarenakan jamur *Aspergillus flavus* dapat memproduksi aflatoksin (Ramirez-Camejo *et al.*, 2012; Richard dan Payne 2003), dapat berkolonisasi di berbagai macam substrat, dan memiliki toleransi²⁶ terhadap suhu dan salinitas yang tinggi (Hedayati *et al.*, 2007; Mellon¹⁸ *et al.*, 2007; Zuluaga-Montero *et al.*, 2010). Dalam penelitian ini tampak bahwa kloramfenikol lebih efisien dalam menghambat pertumbuhan bakteri *S. aureus* dibandingkan dengan bakteri *E. coli*. Kontrol

negatif berfungsi untuk memperlihatkan apakah etil asetat berpengaruh pada isolat atau tidak. Dalam penelitian ini, kontrol negatif tidak menunjukkan⁷ adanya zona hambat terhadap bakteri *E. coli*, *S. aureus*, dan jamur¹ *C. albicans*.

Senyawa antibakteri dapat digolongkan juga sebagai spektrum luas dan spektrum sempit. Spektrum luas artinya senyawa tersebut bekerja aktif terhadap banyak jenis bakteri baik bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sedangkan spektrum sempit artinya suatu senyawa bekerja aktif hanya terhadap satu golongan bakteri saja baik hanya pada bakteri gram positif ataupun hanya pada bakteri gram negatif (WHO, 2014). Dari beberapa penelitian² yang telah dilakukan sebelumnya (Sumilat *et al.*, 2014; Wewengkang *et al.*, 2014; Sumilat *et al.*, 2018), menyatakan bahwa ascidian *Eudistoma* sp. menghasilkan senyawa bioaktif yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa antimikroba ascidian *Eudistoma* sp. termasuk berspektrum luas¹⁰ karena kemampuannya menghambat bakteri gram positif dan gram negatif. Selain itu, senyawa³⁴ antimikroba ascidian *Eudistoma* sp. juga mampu menghambat pertumbuhan jamur dari *C. albicans*.

Hal ini menunjukkan bahwa di lingkungan tempat hidupnya ascidian memproduksi senyawa antimikroba dalam bentuk metabolit sekunder untuk melawan semua ancaman yang dihadapinya. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa senyawa antimikroba dari jamur simbion ascidian termasuk dalam golongan lemah, sedang, dan kuat merupakan petunjuk mengenai seberapa banyak energi yang dikeluarkan sehingga dapat menghasilkan senyawa antimikroba. Selain itu, tekanan lingkungannya juga berpengaruh dalam hal produksi metabolit sekunder antimikroba dari jamur simbion ascidian *Eudistoma* sp. apabila tekanan lingkungannya relatif rendah maka senyawa yang akan dihasilkan juga pasti sedikit. Kemudian apabila tekanan lingkungannya relatif tinggi maka senyawa

yang dihasilkan akan banyak (Ramirez-Camejo *et al.*, 2012).

12 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa isolat jamur ABU2 2.1. yang bersimbion dengan *Eudistoma* sp. 5,8s ribosomal RNA gene adalah jamur *Aspergillus flavus* dengan keakuratan 100 persen. Hasil uji aktivitas antibakteri dan antijamur ekstrak jamur simbion isolat ABU2 2.1. fraksi etil asetat memiliki aktivitas antimikroba terhadap *E. coli*, *S. aureus* dan *C. albicans*. Aktivitas tertinggi dengan diameter zona hambat tertinggi yaitu pada pengamatan 1x24 jam, dengan diameter zona hambat 10,00 mm terhadap *E. coli*, 19,00 mm terhadap *S. aureus*, dan 13,50 mm terhadap *C. albicans*. Senyawa antimikroba isolat ABU2 2.1. yang bersimbion dengan ascidian *Eudistoma* sp. pada fraksi etil asetat termasuk berspektrum luas diketahui kemampuannya menghambat bakteri gram positif dan gram negatif. Selain itu, isolat tersebut juga mampu menghambat pertumbuhan dari jamur *C. albicans*.

DAFTAR PUSTAKA

- 47 Ali HAJ., Tamilselvi M. 2016. *Ascidians in Coastal Water: A Comprehensive Inventory of Ascidian Fauna from the Indian Cost*. Springer International Publishing. Switzerland. Hal 4-30.
- 54 Chan, STS., Pearce, AN., Januario, AH., Page, MJ., Kaiser, M. McLaughlin, RJ., Harper, JL., Webb, VL., Barker, D. and Copp, BR. 2011. Anti-inflammatory and Antimalarial Meroterpenoids from the New Zealand Ascidian *Aplidium scabellum*. *J. Org. Chem.* 76 : 9151-9156.
- Colin PL., Arneson AC. 1995. *Tropical Pasific Invertebrates: A Field Guide to the Marine Invertebrates Occuring on Tropical Pasific Coral Reefs, Seagrass Beds and Mangroves*. Coral Reef Press. Beverly Hills, California. USA. Hal 275.
- 19 Davis, WW., Stout, TR. 1971. Disc Plate Methods Of Microbiological Antibiotic Assay. *Microbiology*. 22: 659-665.
- 53 Donia MS., Wang B., Dunbar DC., Densai P. V., Patny A., Avery M., Hammna M. T. 2008. Mollamides B and C, Cyclic Hexapeptides from the Indonesian Tunicate *Didemnum molle*. *J. Nat. Prod.* 71: 941-945.
- 13 Hedayati MT., Pasqualotto AC., Warn PA., Bowyer P., Denning DW. 2007. *Aspergillus flavus*: human pathogen, allergen and mycotoxin producer. *Microbiology* 153: 1677-1692.
- 25 Jawetz E., Melnick JL., Adelberg EA. 2016. *Medical Microbiology* Edisi ke-27. McGraw Hill Education. Hal. 363.
- 2 Kjer J., Debbab A., Aly AH., Proksch P. 2010. Methods for isolation of marine-derived endophytic fungi and their bioactive secondary products. *Nature Protocols*. 5 (3): 479-488.
- Losung F., Bara RA., Angkouw ED.. 2015. Isolasi Antimikroba Dari Jamur Yang Bersimbiosis Dengan Biota Laut. *Jurnal LPPM Bidang Sains Dan Teknologi*. 2 (2): 37-41.
- Macpal Y., Warouw V., Sumilat D A., Paulus JJH., Rumampuk NDC., Kreckhof RL. 2019. Aktivitas Antibakteri Dan Anti UV Beberapa Ascidian Dari Perairan Pangalingsang Bunaken. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*. 7 (3): 273-285.
- 23 Mangindaan R.E.P. dan Taroreh R.Y. 2013. Pengujian Aktivitas Larvasida dari Ekstrak Ascidian *Lissoclinum pattela* Terhadap Larva Nyamuk *Aedes aegypti*. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*. 3(1): 13-17.
- Melliawati R. 2009. *Escherichia coli* dalam kehidupan manusia. *Biotrends*. 4: 1.
- Mellan J.E., Cotty PJ., Dowd MK. 2007. *Aspergillus flavus* hydrolases: their roles in pathogenesis and substrate utilization. *Applied Microbiology and Biotechnology* 77: 497-504.
- Moerid MS., Mangindaan, REP., Losung F. 2013. Uji Aktivitas Larvasida Nyamuk

- Aedes aegypti dari Beberapa Ekstrak Ascidian. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. 1(1):15-20.
- Opa SL., Bara RA., Gerung GS., Rompas R M., Lintang RAJ., Sumilat DA. 2018. Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi N-Heksana, Metanol Dan Air Dari Ascidian *Lissoclinum* sp. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. 1(1): 69-80.
- ⁴⁶ Proksch P., Ebrada RA., Ebel R. 2002. Drugs from The Seas-Current Status and Microbiological Implications. Appl. Microbiol. Biot. 59 :125-134.
- ² Ramirez-Camejo LA., Zalunga-Montero A., Lazaro-Escuedo M., Hernandez-Kendall V., Baymann P. 2012. Phylogeography of cosmopolitan fungus *Aspergillus flavus*: is everything everywhere? British Micological society. 1 (16): 452-463
- ⁵² Reddy DRS., Audi 3 di AV., Reddy GD., Bhaskar CVS. 2011. Antioxidant, Anti-Inflammatory and Antifungal Activity of Marine Sponge *Subergorgia suberosa*-Derived Natural Products. International Journal of Pharm Tech. Research.3 (1): 342-348.
- Richard JL., Payne GA., 2003. Mycotoxins: risks in plant, animal, and human systems. Council for Agricultural Science and Technology. Task Force Report. 139: 422-434.
- ²⁴ Rumengen AP. 2010. Uji Larvasida Nyamuk (Aedes aegypti) dari Ascidian (*Didemnum molle*). Jurnal Perikanan dan Kelautan. 6(2): 83-86.
- Sumilat DA., Wewengkang DS., Paruntu C P., Rumampuk NDC., Rotinsulu H. 2014. Cytotoxic Activity of Ascidians *Eudistoma* sp. From Mantehage Island Manado. Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi. 1(1): 1-6.
- ² Sumilat DA., Yamazaki H., Endo K., Rotinsulu H., Wewengkang DS., Ukai K., Namikoshi M. 2017. A new biphenyl eter derivative produced by Indonesian ascidians-derived *Penicillium albobiverticillium*. J. Nat. Med. 71:776-779.
- Sumilat DA., Wewengkang DS., Rotinsulu H., Yamazaki H., Taiko O., Ukai K., ⁵⁰
- ¹⁵ Namikoshi M. 2018. Bioactivity of Extracts from Ascidiants Collected in North Sulawesi As Seeds of Marine-Derived Drugs. AACL Bioflux.11 (2): 516-512.
- Wang W., Nam SJ., Lee BC., Kang H. 2008. Beta-carboline Alkaloids from A Korean Tunicate *Eudistoma* sp. J. Nat. Prod. 71(2) ²⁰:163-169.
- Warsa VC. 1994. Kokus Positif Gram. Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran. Fakultas Kedokteran UI. Jakarta. Binarupa Aksara. Hal 5-22.
- Wewengkang DS., Sumilat DA., Rotinsulu H. 2014. Sitotoksitas Ekstrak Kasar Ascidian dari Pulau Bunaken. Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi. 1(1): 86-89.
- WHO. 2014. Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. World Health Organization. Hal. 257.
- ⁴⁹ Wikler MA., Cockeril FR., Bush K., Dudley MN., Eliopoulos JM., Hardy DJ., Hecht DW. 2009. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests: Approved Standard 10th Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute. Pennsylvania, USA. Hal. 11-17.
- ⁴⁸ Zuluaga-Montero A., Ramirez-Camejo L., Rauscher J., Bayman P. 2010. Marine isolates of *Aspergillus flavus*: denizens of the deep or lost at sea? Fungal Ecology 3:386-391.

BIOAKTIVITAS JAMUR Aspergillus flavus YANG BERSIMBION

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

2%

2

link.springer.com

1%

3

media.neliti.com

1%

4

**Jeksen Liem, Robert Bara, Deiske Sumilat,
Veibe Warouw, Fitje Losung, Adnan Wantasen.
"Bioprospeksi antibakteri beberapa jenis spons
dari Perairan Pangalisang Bunaken", JURNAL
PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2019**

1%

5

vdokumen.com

1%

6

etheses.uin-malang.ac.id

1%

7

eprints.unsri.ac.id

1%

docobook.com

8

Internet Source

1 %

9

[id.scribd.com](#)

Internet Source

1 %

10

[id.123dok.com](#)

Internet Source

1 %

11

Galih Prasetyo, Remmy Mangindaan, Robert Antonius Bara. "SUBSTANSI ANTIBAKTERI JAMUR ENDOFIT PADA LAMUN ASAL PERAIRAN TONGKAINA", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2017

Publication

1 %

12

[jurnal.farmasi.umi.ac.id](#)

Internet Source

1 %

13

[repositorium.sdum.uminho.pt](#)

Internet Source

1 %

14

Gledys Giacinta Poluan, Elvy Like Ginting, Stenly Wullur, Veibe Warouw, Fitje Vera Losung, Meiske Salaki. "KARAKTERISTIK MORFOLOGI BAKTERI SIMBION SPONS MENYERUPAI Cribochalina sp DARI PERAIRAN MALALAYANG SULAWESI UTARA", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2019

Publication

1 %

15	ar.iiarjournals.org Internet Source	1 %
16	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
17	Noviano B. Reppi, Christi Mambo, Jane Wuisan. "Uji efek antibakteri ekstrak kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii) terhadap Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes", Jurnal e- Biomedik, 2016 Publication	<1 %
18	Yanti Y. Warbung. "Daya Hambat Ekstrak Spons Laut Callyspongia sp terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus", e- GIGI, 2013 Publication	<1 %
19	iopscience.iop.org Internet Source	<1 %
20	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
21	Raja Doli, Desy MH Mantiri, Darus Paransa, Kurniati Kremer, Rosita Lintang, Sipriani Tumembow. "ANALISIS PIGMEN KLOROFIL PADA ALGA Kappaphycus alvarezii YANG DIBUDIDAYAKAN DI TELUK TOTOK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2020	<1 %

- 22 Submitted to Syiah Kuala University <1 %
Student Paper
-
- 23 repository.its.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 24 jurnal.unej.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 25 ejurnal.bppt.go.id <1 %
Internet Source
-
- 26 Luis A. Ramírez-Camejo, Anabella Zuluaga-Montero, María Lázaro-Escudero, Verónica Hernández-Kendall, Paul Bayman.
"Phylogeography of the cosmopolitan fungus *Aspergillus flavus*: is everything everywhere?", Fungal Biology, 2012
Publication
-
- 27 Ade Nurdin, Khumaira Puspasari, Eka Nurdian, Tina Y. Asri, Tauhid Tauhid.
"PENGEMBANGAN TEKNIK DIAGNOSA PENYAKIT EPIZOOTIC ULCERATIVE SYNDROME (EUS) PADA IKAN MELALUI PENDEKATAN GEJALA KLINIS, ISOLASI PATOGEN, HISTOPATOLOGIS", Jurnal Riset Akuakultur, 2012
Publication
-
- 28 Submitted to Universitas Brawijaya

<1 %

-
- 29 e-journal.uajy.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 30 www.slideshare.net <1 %
Internet Source
-
- 31 garuda.ristekdikti.go.id <1 %
Internet Source
-
- 32 adoc.tips <1 %
Internet Source
-
- 33 repository.unhas.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 34 jurnal.untan.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 35 www.ejournal-s1.undip.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 36 Lilis Sugiarti, Sri Fitrianingsih. "AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PARIJOTO (*Medinilla speciosa* Blume) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI *Propionibacterium acnes* DAN *Staphylococcus aureus*", Cendekia Journal of Pharmacy, 2018
Publication
-
- 37 www.smkn1kalibagor.sch.id <1 %
Internet Source

38	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
39	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
40	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
41	Megawati S. Saroinsong, Febby E. F. Kandou, Adelfia Papu, Marina F. O. Singkoh. "Uji Daya Hambat Ekstrak Metanol Beberapa Jenis Porifera Terhadap Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus", Jurnal MIPA, 2014 Publication	<1 %
42	mymoeta.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	Nia Purnama Ningsih, Rafika Sari, Pratiwi Apridamayanti. "OPTIMASI AKTIVITAS BAKTERIOSIN YANG DIHASILKAN OLEH Lactobacillus brevis DARI ES PISANG IJO", Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains, 2018 Publication	<1 %
44	Soheil Alinezhad, Azizollah Kamalzadeh, Masoomeh Shams-Ghahfarokhi, Mohammad-Bagher Rezaee et al. "Search for novel antifungals from 49 indigenous medicinal plants: Foeniculum vulgare and Platycladus orientalis as strong inhibitors of aflatoxin production by	<1 %

**Aspergillus parasiticus", Annals of Microbiology,
2011**

Publication

45

Mohammad Naved Khan, Tabrez Alam Khan,
Zaheer Khan, Shaeel Ahmed AL-Thabaiti.

<1 %

"Green synthesis of biogenic silver
nanomaterials using Raphanus sativus extract,
effects of stabilizers on the morphology, and
their antimicrobial activities", Bioprocess and
Biosystems Engineering, 2015

Publication

46

amslaurea.unibo.it

<1 %

Internet Source

47

Satheesh Kumar Palanisamy, Velusamy
Arumugam, Magesh D. Peter, Umamaheswari
Sundaresan. "Patterns of chemical diversity in
the marine ascidian Phallusia spp.: anti-tumor
activity and metabolic pathway inhibiting steroid
biosynthesis", 3 Biotech, 2018

<1 %

Publication

48

bdigital.unal.edu.co

<1 %

Internet Source

49

www.ajtmh.org

<1 %

Internet Source

50

www.bioflux.com.ro

<1 %

Internet Source

- 51 www.tandfonline.com <1 %
Internet Source
- 52 V. P. Limna Mol, Anas Abdulaziz, K. G. Sneha, P. J. Praveen, T. V. Raveendran, P. S. Parameswaran. "Inhibition of pathogenic *Vibrio harveyi* using calamenene, derived from the Indian gorgonian *Subergorgia reticulata*, and its synthetic analog", 3 Biotech, 2020 <1 %
Publication
- 53 www.degruyter.com <1 %
Internet Source
- 54 Kajal Chakraborty, Soumya Salas. "First report of antioxidant 1 -benzochromenone from muricid gastropod as dual inhibitors of pro-inflammatory 5-lipoxygenase and carbolytic enzymes ", Natural Product Research, 2019 <1 %
Publication
- 55 Eflentina Kipimbob, Robert Bara, Pemsi M. Wowor, Jimmy Posangi. "Uji Efek Antibakteri *Chromodoris dianae* terhadap Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*", Jurnal e-Biomedik, 2019 <1 %
Publication
- 56 ejournal.unsrat.ac.id <1 %
Internet Source
- 57 Olivia C. Simatupang, Jemmy Abidjulu, Krista V.

Siagian. "Uji daya hambat ekstrak daun mengkudu (*Morinda citrifolia L.*) terhadap pertumbuhan *Candida albicans* secara *in vitro*", e-GIGI, 2017

<1 %

Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On