

PENAMBATAN MOLEKUL GLUTATION FAUNA LAUT TERHADAP RESEPTOR DARI BEBERAPA PENYAKIT VIRUS

by Deiske Sumilat 74

Submission date: 23-Aug-2021 11:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1634626431

File name: ON_FAUNA_LAUT_TERHADAP_RESEPTOR_DARI_BEBERAPA_PENYAKIT_VIRUS.pdf (598.54K)

Word count: 2436

Character count: 14472

PENAMBATAN MOLEKUL GLUTATION FAUNA LAUT TERHADAP RESEPTOR DARI BEBERAPA PENYAKIT VIRUS

(Molecular docking of marine fauna glutathion towards receptors of several viral diseases)

⁷ Q Xaxa Alvin Kai¹, Inneke F. M. Rumengen^{1*}, Rosita A. J. Lintang¹, Stenly Wullur¹, Deiske A. Sumilat¹, Henneke Pangkey², dan Hein A. Luntungan³

⁷ ¹Program Studi Ilmu Kelautan, FPIK, UNSRAT

²Program Studi Budidaya Perikanan, FPIK, UNSRAT

³Dinas Kesehatan, Provinsi Sulawesi Utara

*Corresponding author:innekerumengen@unsrat.ac.id

ABSTRACT

Glutathion is a tripeptides produced by almost all living creatures, including marine fauna such as rotifers and shrimps. Judging from the important molecular role of glutathion in living cell, the ability of glutathion as antiviral compound, has been assed by application of the *AutodockTools* to predict the ability of glutathion as ligand to bind receptors of several viral diseases such as covid-19, malaria, and hepatitis B. Docking results of glutathion toward target receptor were shown by the parameter, Gibbs energy value, and supported by other data such as the amount of hydrogen bond, amino acid residues, and bond distance. Evidently, the glutathion could bind to each receptor of covid-19, malaria and hepatitis B, with values of Gibbs energy (ΔG), -7,9, 7,1 and -7,1 kcal/mol, respectively. This proves that glutathion has ability to bind covid-19 receptor, even stronger than its ability to bind receptors of other viral diseases, and to the remdesevir. Between glutathion and covid-19 receptor, there were 11 hidrogen bonds, with distance ranged from 2,76 to 3,25 Å. These were stronger than those between glutathion and receptors of malaria and hepatitis B, only 8 and 4 Å hidrogen bonds, respectively. To develop glutathion as antiviral drug, it is necessary to carry out *in vitro* and *in vivo* analyses, prior to clinical test. Therefore, it requires to explore the marine fauna species that produce glutathion and their cultivation.

Keywords: molecular docking, glutathion, marine fauna, autodock vina, viral diseases, binding affinity

Glutation merupakan senyawa tripeptida yang diproduksi pada hampir di semua mahluk hidup, termasuk fauna laut seperti rotifer dan udang. Ketertarikan akan peranan penting molekuler glutation dalam sel hidup, maka kemampuan glutation sebagai senyawa anti virus telah dikaji dengan aplikasi piranti lunak *AutodockTools* untuk memprediksi kemampuan glutation sebagai ligan untuk mengikat reseptor beberapa penyakit virus seperti covid-19, malaria, dan hepatitis b. Hasil penambatan glutation terhadap reseptor-reseptor target diperlihatkan dengan parameter besaran energi Gibbs, dan didukung oleh data lain seperti jumlah ikatan hidrogen, residu asam-asam amino yang berikatan dan jarak ikatan. Ternyata glutation mampu terikat dengan setiap reseptor dan covid-19, malaria dan hepatitis b, dengan besaran energi Gibbs (ΔG) masing-masing -7,9, 7,1 dan -7,1 kcal/mol. Terbukti disini glutation memiliki kemampuan mengikat reseptor covid-19 lebih kuat dari kemampuan mengikat reseptor penyakit virus lainnya, dan obat remdesevir, dengan adanya 11 ikatan hidrogen yang terbentuk, dengan jarak ikatan berkisar 2,76 sampai 3,25 Å, lebih kuat daripada ikatan terhadap reseptor malaria dan hepatitis b, masing-masing hanya 8 dan 4 Å ikatan hidrogen. Untuk mengembangkan obat anti virus, perlu dilanjutkan dengan uji-ujji secara *in vitro* dan *in vivo*, sebelum ke uji klinis. Oleh karena itu, perlu mengeksplorasi jenis-jenis fauna laut yang berpotensi menghasilkan glutation dan penjajakan kultivasinya.

Kata kunci: penambatan molekul, glutation, fauna laut, autodock vina, penyakit virus, pengikatan afinitas

PENDAHULUAN

Lautan mencakup wilayah perairan terbesar di bumi, menyimpan kekayaan alam

yang luar biasa berupa mineral dan berbagai biomaterial termasuk potensi molekuler yang terkandung dalam beragam organisme penghuninya. Potensi molekuler terpetakan pada urutan genom setiap sel organisme

berupa gen-gen yang terekspresi menjadi molekul-molekul polipeptida (protein) atau oligopeptida (Rumengen, 2019). Molekul-molekul tersebut sangat beragam struktur dan fungsi biologinya yang berpeluang dikembangkan sebagai biomaterial farmasetika jika dieksplorasi. Salah satunya adalah Glutation.

Glutation merupakan senyawa tripeptida yang disintesis oleh hampir semua mahluk hidup termasuk fauna laut seperti udang dan rotifer (Bowman et al., 1990; Prieto-Martínez et al., 2018). Senyawa ini berkonjugasi dengan obat untuk membuatnya lebih larut untuk ekskresi. Dalam sel hidup, senyawa ini bekerja sebagai kofaktor untuk beberapa enzim, terlibat dalam penataan ulang ikatan protein disulfida dan mengurangi peroksida. Sejauh ini glutation mampu mencegah kerusakan komponen seluler penting yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif seperti radikal bebas, peroksida, peroksida lipid, dan logam berat (Pompella et al., 2003)

Molecular docking atau penambatan molekul merupakan sejenis pemodelan komputasi yang menyediakan prediksi orientasi pengikatan yang dipilih dari satu molekul (ligan) ke molekul yang lain (reseptor) sehingga hubungan dari molekul yang berikatan akan membentuk kompleksitas yang stabil (Agarwal et al., 2015)

Penambatan molekul menggunakan fungsi penilaian, seperti pengetahuan tentang orientasi yang diinginkan untuk digunakan memprediksi kekuatan interaksi atau ikatan afinitas antara dua molekul. Transduksi sinyal sangat bergantung pada interaksi molekul penting secara biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Jenis sinyal yang dipancarkan juga dapat dipengaruhi oleh orientasi relatif dari dua molekul yang berinteraksi seperti reseptor dan ligan (Mukesh & Rakesh, 2011).

Energi bebas gibbs adalah suatu potensi termodinamika yang mengukur kapasitas dari sistem termodinamika untuk melakukan pekerjaan maksimum atau reversibel pada suhu dan tekanan konstan (isotermal dan isobarik) adalah salah satu besaran termodinamika terpenting untuk karakterisasi penggerak. Dalam hal ini,

pengikatan antara reseptor dan ligan hanya terjadi jika perubahan energi bebas (ΔG) bernilai negatif ketika 2 molekul tersebut mencapai keadaan kesetimbangan suhu dan tekanan yang konstan. Karena tingkat asosiasi reseptor-ligan ditentukan oleh nilai ΔG yang negatif, dapat dianggap bahwa ΔG menentukan stabilitas kompleks reseptor-ligan(Du et al., 2016)

METODE PENELITIAN

Waktu Penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan perangkat komputer menggunakan beberapa piranti lunak beserta ligan dan reseptor yang didownload dari website <https://rcsb.org> dan <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>. Kegiatan penelitian berlangsung selama ± 3 bulan (Mei-Juli 2021).

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penambatan molekul terdiri dari perangkat keras yaitu laptop Acer (ram 4gb DDR4 dan prosesor AMD 2 core 1.5 Ghz) dan perangkat lunak yaitu Open Babel GUI Discovery studio 2021, Autodock tools, Autodock Vina, Pymol, dan LigPlot.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penambatan molekul yaitu reseptor dan ligan. Reseptor yang digunakan yaitu Covid-19 (7BW4), Malaria (4O2X), dan hepatitis b (6CWD), reseptor ini diunduh dari <https://rcsb.org>. Glutation serta ligan banding diunduh dari website <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>.

Preparasi Ligan

Tahap awal dari penambatan molekul yaitu preparasi ligan. Ligan glutation diunduh dari website dengan format '.sdf', setelah diunduh ligan kemudian diubah menjadi format '.pdb' dengan bantuan aplikasi OpenBabel GUI. Ligan kemudian dibuka di aplikasi Autodock tools kemudian ligan diatur torsion tree dan disimpan dengan format '.pdbqt'

Preparasi Reseptor

Preparasi reseptor, reseptor diunduh dari website <https://rcsb.org> dengan format '.pdb'. Reseptor kemudian dibuka menggunakan perangkat lunak Discovery

Studio, setelah itu reseptor dipisahkan dari ligan dan jika perlu *water molecules*. Reseptor kemudian disimpan dengan format '.pdb'. Aplikasi program ini telah pula dikaji oleh Rumengar et al. (2021) terhadap beberapa senyawa yang dihasilkan oleh mikroba yang berasosiasi dengan *Ascidia, Lissoclinum patella* dari Teluk Manado Sulawesi Utara.

Buka file molekul target dengan cara *File > Read Molecule > Select File*. Setelah molekul target terbuka kemudian menambahkan atom hidrogen dengan cara *Edit > Hydrogens > Add > Polar only*. Kemudian dilanjutkan dengan menggabungkan non-polar dengan cara *Edit > Hydrogens > Merge non-polar*. Setelah itu tambahkan perhitungan muatan 'Gasteiger' dengan cara *edit > charges > Compute Gasteiger*. Berikutnya molekul target di save dengan cara *Grid > Macromolecule > Choose > Makromolekul > Select Molecule > Save as PDBQT*. Setelah disimpan kemudian membuat *grid box* untuk molekul target dengan cara *Grid > Grid box*. Setelah mengatur *grid box*, catat posisi dan volume dari *grid box* tersebut.

Docking

Reseptor dan ligan yang telah dipreparasi sebelumnya dipindahkan ke dalam folder yang bersamaan dengan aplikasi *autodock vina.exe*, kemudian dikonfigurasi sesuai file molekul target, file ligan dan grid box. Selanjutnya jalankan aplikasi *autodock vina* menggunakan *command prompt* dengan perintah '*vina.exe - config config.txt -log log.txt*' akan mendapatkan hasil yaitu afinitas dan file *out.pdbqt* sebagai visualisasi docking. Hasil afinitas ini diperoleh dalam bentuk nilai

energi bebas (ΔG) yang negatif jika terjadi penambatan, makin kecil nilai ΔG makin stabil ikatannya. Visualisasi hasil docking menggunakan pymol dan evaluasi/analisis bagian-bagian molekul yang berikatan menggunakan LigPlot.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penambatan molekul glutation sebagai ligan ke beberapa penyakit virus berupa nilai affinitas (Tabel 1).

Semakin negatif nilai affinitas maka gaya yang dihasilkan antara ikatan semakin kecil sehingga ikatan antara ligan dan reseptor semakin stabil (Du et al, 2016). Dalam penentuan nilai dari afinitas antara ligan dan reseptor dipengaruhi oleh banyak faktor. Autodock vina memiliki banyak faktor untuk penetuan dari afinitas (ΔG_{bind}), beberapa faktor tersebut yaitu ΔG_{gauss} (dipersi yang berhubungan dengan geometri dan formasi), $\Delta G_{repulsion}$ (bentuk pada kontak internal yang buruk), ΔG_{hbond} (ikatan hidrogen), $\Delta G_{hydrophobic}$ (interaksi hidrofobik), dan yang terakhir ΔG_{tors} (kemampuan rotasi dari ligan) (Apriani, 2015).

Hasil penambatan molekul dari ligan glutation dibandingkan dengan beberapa ligan pembanding yang biasanya diambil dari obat-obat yang dipakai oleh penyakit tersebut. Ligan pembanding bertujuan untuk menilai sejauh mana perbedaan nilai afinitas antara ligan glutation dengan ligan obat, sehingga dapat terlihat potensi dari ligan glutation tersebut.

Tabel 1. Hasil afinitas docking antara ligan glutation dan ligan pembanding

Ligan	7BW4 Covid-19 (kcal/mol)	4O2X Malaria (kcal/mol)	6CWD Hepatitis B (kcal/mol)
Glutation	-7.9	-7.1	-7.1
Remdesivir	-7.2		
Xanthan	-7.2		
Chloroquin	-5.9	-7.1	
Adefovir			-7.4
Entecavir			-8.4


Doxycycline		-12.9	
-------------	--	-------	--

Nilai afinitas antara glutation dan 7bw4 (covid-19) memiliki nilai yang terkuat jika dibandingkan dengan ligan obat seperti *remdesivir* ataupun *xanthon*. Namun sebagian besar dari nilai afinitas dari glutation jika dibandingkan dari beberapa penyakit memiliki nilai yang lebih rendah, namun perbedaannya tidak terlalu jauh.

Visualisasi penambatan diperlukan agar dapat mengetahui letak dari ligan dan reseptor itu tertambat. Selain untuk melihat dari sisi tertambat, visualisasi docking juga diperlukan agar tidak ada kesalahan dalam proses docking, sehingga jika ada error dalam penempatan dari docking bisa terlihat dalam visualisasi.

Dapat diliat dari visualisasi, ligan yang tertambat berbentuk bola dengan warna yang tidak transparan mengisi celah yang ada di dalam reseptor. Sisi yang transparan merupakan bagian dari reseptor, sehingga dapat diliat letak dan bentuk ligan yang tertambat.


Hasil dari penambatan molekul antara ligan dan reseptor juga dapat mengetahui jumlah ikatan, jarak ikatan, asam amino yang berikatan dengan ligan, dan gugus senyawa yang berikatan antara ligan dan reseptor, sehingga dapat mengetahui lebih jauh tentang analisis dari penambatan molekul.



Gambar 1. Visualisasi docking Covid-19 (7BW4) dan glutation.

Tabel 2. Ikatan dan residu protein dari Covid-19 (7BW4) dan glutation.

1	Jumlah Ikatan Hidrogen	Jarak Ikatan (Å)	Asam amino yang berikatan	Gugus senyawa yang berikatan
11	2,76		19	O-O
	3,15		Asp358(Å)	O-O
	3,18			O-O
	3,14		Asn360(Å)	N-O
	3,25			O-N
	3,25		Tyr374(Å)	N-O
	3,09		Ser343(Å)	O-O
	2,99			N-O
	2,97			N-O
	3,10		Asp377(Å)	N-O
	3,10			O-O
	3,24		Val535(Å)	O-O




Gambar 2 Visualisasi docking Malaria (4O2X) dan glutation.

Tabel 3. Ikatan dan residu protein dari Malaria (4O2X) dan glutation.

1

Jumlah Ikatan Hidrogen	Jarak Ikatan (Å)	Asam amino yang berikatan	Gugus senyawa yang berikatan
8	2,83	Asp96(Å)	O-O
	3,14	Tyr177(Å)	N-O
	3,16		N-O
	3,25	Phe170(Å)	O-N
	2,88		O-O
	2,91	Ala169(Å)	O-N
	3,25		O-O
	2,88	Glu329(Å)	N-O



Gambar 3. Visualisasi docking hepatitis b (6CWD) dan glutation.

Tabel 4. Ikatan dan residu protein dari hepatitis b (6CWD) dan glutation.

1

Jumlah Ikatan Hidrogen	Jarak Ikatan (Å)	Asam amino yang berikatan	Gugus senyawa yang berikatan
4	3,08	His104(H)	O-N
	2,98		O-N
	3,23	Arg56(D)	O-O

3,14 Gln57(D) O-O

Jarak ikatan antar ligan dan molekul memiliki peran yang penting dalam menentukan ikatan tersebut, semakin pendek ikatan tersebut maka ikatannya menjadi semakin kuat. Itu juga terjadi pada ikatan hidrogen, semakin banyak ikatan hidrogen pada antar molekul maka semakin stabil juga ikatan tersebut (Anon, 2020).

KESIMPULAN

Glutation terbukti secara *in silico* mampu terikat dengan reseptor covid-19, malaria dan hepatitis, dengan besaran energi Gibbs (ΔG) masing-masing -7,9, 7,1 dan -7,1 kcal/mol. Jadi affinitas pengikatan glutation terhadap reseptor Covid-19 lebih kuat dari terhadap reseptor penyakit virus lainnya, bahkan lebih kuat dari obat remdesesvir. Hal ini didukung oleh data lain, yaitu sebanyak 11 ikatan hidrogen dengan jarak ikatan berkisar 2,76 sampai 3,25 Å, lebih tinggi daripada terhadap reseptor malaria dan hepatitis yang jumlah ikatan hidrogennya masing-masing hanya 8 dan 4 Å.

SARAN

Untuk mengembangkan glutation sebagai obat antivirus, perlu dilanjutkan dengan uji-ujinya secara *in vitro* dan *in vivo* sebelum ke uji klinis. Untuk itu, perlu mengeksplorasi jenis-jenis fauna laut yang berpotensi menghasilkan glutation dan penjajakan kultivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, S., Chadha, D., & Mehrotra, R. (2015). Molecular modeling and spectroscopic studies of semustine binding with DNA and its comparison with lomustine-DNA adduct formation. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics*, 33(8), 1653–1668. <https://doi.org/10.1080/07391102.2014.968874>

- Apriani, F. (2015). Studi Penambatan Molekul Senyawa-Senyawa Amidasi Etil Para Metokisinamat Pada Peroxisome Proliferator-Activated

- Receptor-Gamma (Ppary).** 1–121.
Bond Order and Lengths. (2020).
<https://chem.libretexts.org/@go/page/1982>
- 3** Bowman, B. P., Snell, T. W., & Cochrane, B. J. (1990). Isolation and purification of glutathione S-transferases from *Brachionus plicatilis* and *B. calyciflorus* (Rotifera). *Comparative Biochemistry and Physiology -- Part B: Biochemistry* *111d*, 95(3), 619–624.
[https://doi.org/10.1016/0305-0491\(90\)90031-N](https://doi.org/10.1016/0305-0491(90)90031-N)
- 9** Du, X., Li, Y., Xia, Y. L., Ai, S. M., Liang, J., Sang, P., Ji, X. L., & Liu, S. Q. (2016). Insights into protein–ligand interactions: Mechanisms, models, and methods. *International Journal of Molecular Sciences*, 17(2), 1–34.
<https://doi.org/10.3390/ijms17020144>
- Mukesh, B., & Rakesh, K. (2011). ISSN 2229-3566 Review Article
MOLECULAR DOCKING : A REVIEW
Bachwani Mukesh *, Kumar Rakesh.
International Journal of Research in Ayurveda & Pharmacy, 2(6), 1746–1751.
- 12** Pompella, A., Visvikis, A., Paolicchi, A., De Tata, V., & Casini, A. F. (2003). The changing faces of glutathione, a cellular protagonist. *Biochemical Pharmacology*, 66(8), 1499–1503.
[https://doi.org/10.1016/S0006-2952\(03\)00504-5](https://doi.org/10.1016/S0006-2952(03)00504-5)
- Prieto-Martínez, F. D., Arciniega, M., & Medina-Franco, J. L. (2018). Acoplamiento Molecular: Avances Recientes y Retos. *TIP Revista Especializada En Ciencias Químico-Biológicas*, 21, 65–87.
<https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2018.0.143>
- Rumengan, I. F. M., 2019. *Rekayasa Genetika Biota Air*. 2nd ed. Manado:
LPPM Universitas Sam Ratulangi.hal.248
- Rumengan, I. F., Roring, V. I., Haedar, J. R., Siby, M. S., Luntungan, A. H., Kolondam, B. J., ... & Wakimoto, T. (2021). Ascidian-associated photosymbionts from Manado,
- 13** Indonesia: secondary metabolites, bioactivity simulation, and biosynthetic insight. *Symbiosis*, 84(1), 71–82.

PENAMBATAN MOLEKUL GLUTATION FAUNA LAUT TERHADAP RESEPTOR DARI BEBERAPA PENYAKIT VIRUS

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | text-id.123dok.com | 2% |
| | Internet Source | |
| 2 | Oscar M Lamohamad, Kurniati Kemer, Desy M H Mantiri, Ester Angkow, James Paulus, Adnan S Wantasen. "Ekstraksi Pigmen Klorofil Total Pada Mikroalga Dunaliella sp. Yang Telah diberi Perlakuan Timbal Asetat", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2021 | 2% |
| | Publication | |
| 3 | app.trdizin.gov.tr | 1% |
| | Internet Source | |
| 4 | id.cenlamontessori.org | 1% |
| | Internet Source | |
| 5 | Submitted to Universitas Sam Ratulangi | 1% |
| | Student Paper | |
| 6 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar | 1% |
| | Student Paper | |
-

7	Gianfranco Montolalu, Deiske A Sumilat, Natalie D.C. Rumampuk, Inneke FM Rumengan, Rosita AJ Lintang, Renie Lucia Kreckhoff. "ISOLASI JAMUR SIMBION ASCIDIA Schizophyllum commune YANG MEMILIKI AKTIVITAS ANTIBAKTERI", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2021 Publication	1 %
8	123dok.com Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
10	www.tandfonline.com Internet Source	<1 %
11	link.springer.com Internet Source	<1 %
12	www.koreascience.or.kr Internet Source	<1 %
13	www.x-mol.com Internet Source	<1 %
14	Aisin Umasugi, Reiny A. Tumbol, Reni L. Kreckhoff, Henky Manoppo, Novie P.L. Pangemanan, Elvi L. Ginting. "Penggunaan bakteri probiotik untuk pencegahan infeksi bakteri Streptococcus agalactiae pada ikan	<1 %

Nila, Oreochromis niloticus", e-Journal
BUDIDAYA PERAIRAN, 2018

Publication

-
- 15 Joshian Nicolas William Schaduw, Fihri Bachmid, Stephen Ronoko, Kunio Legi et al. "Characteristics of Marine Debris in Malalayang Coastal Area, Manado City, North Sulawesi Province", Jurnal Ilmiah PLATAK, 2021 <1 %
- Publication
-
- 16 etheses.uin-malang.ac.id <1 %
- Internet Source
-
- 17 mgldev.scripps.edu <1 %
- Internet Source
-
- 18 www.kursksalvage.com <1 %
- Internet Source
-
- 19 repository.edulll.gr <1 %
- Internet Source
-

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off