

Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Rimpang Lengkuas Putih (*Alpinia Galanga* L. Willd) Thdp Bakteri *Klebsiella Pneumoniae* Isolat Urin Pd Penderita Infeksi Saluran Kemih

by Fatimawali 14

Submission date: 21-Oct-2021 07:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 1679591763

File name: la_Pneumoniae_Isolat_Urin_Pd_Penderita_Infeksi_Saluran_Kemih.pdf (235.49K)

Word count: 2549

Character count: 15592

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL
RIMPANGLENGKUAS PUTIH (*Alpinia galanga* L. Willd)
TERHADAPBAKTERI *Klebsiella pneumoniae* ISOLAT URIN PADA
PENDERITA INFENSI SALURAN KEMIH**

8 Arini Shintia¹⁾, Fatimawali¹⁾, Jainer Pasca Siampa¹⁾

¹⁾Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115

ABSTRACT

White galangal rhizome is a plant that has properties such as antifungal and antibacterial. White galangal rhizome contains of active compound²⁵s, namely flavonoid, phenol and terpenoid compounds which can inhibit microbes. This study aimed to determine the antibacterial activity of ethanol extracts of white galangal rhizome against Klebsiella pneumoniae urine isolate in patients with²⁷ urinary tract infections. White galangal rhizome plants were extracted using 96% ethanol solvent. Antibacterial activity test was performed using the disc and wells method. The result showed that ethanol extracts of white galangal rhizome has antibacterial activity against the bacteria Klebsiella pneumoniae. In the disc method with concentrations⁵ of 80%, 60%, 40%, 20% and 10% the diameter of the inhibition zone formed are 9,8 mm; 9 mm; 7,8 mm; 7,9 mm and 7,7 mm. Inhibition of the disc method is categorized as medium because the diameter of the zone formed is only around an average of 5-10 mm. Whereas in the wells method for concentrations⁹ of 80%, 60%, 40%, 20% and 10% the diameter of the inhibition zone are 11,3 mm; 10,3 mm; 9,3 mm; 6,3 mm and 2,6 mm. The inhibitory ability at concentrations of 80% and 60% is categorized as strong because it has an average of 10-20 mm, for concentrations of 40% and 20% are categorized as medium, because it has an average inhibition zone diameter of 5-10 mm, and for concentration of 10% is categorized as weak because it has a inhibition diameter <5 mm.

Keywords: *White Galangal Rhizome (*Alpinia galanga* L. Willd), Klebsiella pneumonia*

ABSTRAK

Rimpang lengkuas putih merupakan tanaman yang memiliki khasiat di antaranya sebagai antifungus³⁷ dan antibakteri. Rimpang Lengkuas putih mengandung golongan senyawa aktif¹⁵ itu golongan senyawa flavonoid, fenol dan terpenoid yang dapat menghambat mikroba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang Lengkuas putih terhadap bakteri *Klebsiella pneumoniae* isolat urin pada penderita infeksi saluran kemi²⁴. Tanaman rimpang Lengkuas putih di ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Uji aktivitas antibakteri dengan metode cakram dan sumuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang Lengkuas putih memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Klebsiella pneumoniae*. Pada metode cakram dengan konsentrasi⁵ 80%, 60%, 40%, 20% dan 10% diameter zona hambat yang terbentuk ialah 9,8 mm; 9 mm; 7,8 mm; 7,9 mm dan 7,7 mm. Penghambatan pada metode cakram dikategorikan sedang karena diameter zona yang terbentuk hanya berkisar pada rata-rata 5-10 mm. Sedangkan pada metode sumuran untuk konsentrasi 80%, 60%, 40%, 20% dan 10% diameter zona hambatnya ialah 11,3 mm; 10,3 mm; 9,3 mm; 6,3 mm dan 2,6 mm. Kemampuan penghambatan pada konsentrasi 80% dan 60% di kategorikan kuat karena memiliki diameter zona hambat rata-rata 10-20 mm, untuk konsentrasi 40% dan 20% di kategorikan sedang, karena memiliki diameter zona hambat rata-rata 5-10 mm, dan untuk konsentrasi 10% di kategorikan lemah karena memiliki diameter zona hambat <5 mm.

Kata Kunci: *Rimpang lengkuas putih (*Alpinia galanga* L. Willd), Klebsiella pneumoniae*

PENDAHULUAN

33

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam dunia kesehatan (Rambiko, 2016). Penyakit infeksi pada manusia salah satunya disebabkan oleh infeksi bakteri patogen. Beberapa tahun terakhir ini, bakteri patogen yang resisten terhadap obat semakin banyak dikarenakan pemakaian obat antimikroba komersil yang tidak tepat pada pengobatan penyakit infeksi (Merchese and Shito, 2001; Karaman *et al.*, 2003 dalam Aliero *et al.*, 2008). Pengobatan penyakit infeksi umumnya menggunakan antibiotik. Pemakaian antibiotik secara rasional sudah menjadi keharusan.

Ketidakrasionalan penggunaan dan pemakaian yang tidak tepat akan menyebabkan munculnya banyak efek samping dan resistensi bakteri (Sutrisna, 2012). Situasi tersebut ditambah dengan efek samping yang tidak diinginkan dari beberapa obat antibiotik dan kebutuhan yang mendesak untuk penyembuhan penyakit infeksi. Masalah-masalah di atas merupakan problem yang serius dalam dunia kesehatan, sehingga mendesak para ilmuwan untuk mencari obat antibakteri yang baru yang berasal dari tanaman (Merchese and Shito, 2001; Karaman *et al.*, 2003 dalam Aliero *et al.*, 2008).

Rimpang Lengkuas putih mengandung kurang lebih 1% minyak atsiri berwarna kuning kehijauan. Selain itu rimpang Lengkuas juga mengandung resin yang disebut galangol, kristal berwarna kuning yang disebut kaemferid, galangin, kadinen, heksabidrokadalen hidrat, kuersetin dan

amilum (sinaga, 2005). Hasil penapisan fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol rimpang Lengkuas putih mengandung flavonoid, tanin, kuinon dan steroid atau terpenoid. Rimpang Lengkuas putih memiliki kandungan senyawa flavonoid yang diduga dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik (Kusriani dan shofia, 2015).

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah suatu keadaan yang disebabkan karena adanya invasi bakteri pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri *Escherechia coli*, *Klebsiella pneumoniae* dan *Pseudomonas aeruginosa* (Tessy & Suwanto, 2001). Antibiotik yang digunakan untuk pengobatan ISK sebagian besar yakni fluoroquinolon dan nitrofurantoin (Useng, 2014).

Salah satu keanekaragaman hayati yang mempunyai banyak manfaat yaitu Lengkuas putih (*Alpinia galanga* L. Willd). Lengkuas putih (*Alpinia galanga* L. Willd) merupakan anggota familia Zingiberaceae. Rimpang lengkuas mudah diperoleh di Indonesia dan manjur sebagai obat gosok untuk penyakit jamur kulit (panu) sebelum obat-obatan modern berkembang seperti sekarang. Lengkuas telah dipelajari oleh ilmuwan terdahulu, ditemukan kandungan bermacam-macam khasiat lengkuas diantaranya sebagai antifungi dan antibakteri. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Yuhamren dkk (2002) yang melihat aktivitas penghambatan oleh minyak atsiri dan fraksi methanol rimpang Lengkuas pada beberapa spesies bakteri dan fungi.

Menurut penelitian Puput (2018) ekstrak rimpang Lengkuas putih (¹⁷*Zingiber officinale*) mempunyai daya antibakteri. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk ³⁰embuktikan aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol rimpang Lengkuas putih (*Alpinia galanga* L. Willd) terhadap bakteri *Klebsiella pneumoniae* isolat urin pada penderita infeksi saluran kemih.

METODOLOGI PENELITIAN

22 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada ¹⁹15 Mei 2019 – Juli 2019 di laboratorium Farmasi Lanjutan Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas ²⁹Ratulangi Manado.

Alat dan Bahan

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu timbangan analitik (aeADAM[®]), blender (Philips[®]), oven, gelas ukur (Pyrex[®]), tabung reaksi (Pyrex[®]), Erlenmeyer (Pyrex[®]), beker gelas (Pyrex[®]), corong, batang pengaduk, cawan petri (Pyrex[®]), kertas saring, ayakan, jarum ose, pecadang, pingset, mikropipet (ecopipetteTM), laminar air flow (N-Biotec[®]), autoklav (ALP[®]), incubator (MMM Group[®]), aluminium foil, Hot plate (NESCO[®]Lab), mistar berskala (Combo[®]), kertas lebel dan spritus.

28 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bakteri *Klebsiella pneumoniae*, ekstrak rimpang Lengkuas putih, etanol 96%, aquades, media nutrient agar (NA), kertas cakram, kertas cakram antibiotik, Ciprofloxacin, NaCl 0,9%, H₂SO₄ 0,36 N dan BaCl₂.2H₂O 1,175%, larutan McFarland dan CMC 1%.

Prosedur Kerja

Pengambilan Sampel

⁸Sampel yang digunakan diambil dari Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sampel yang diambil adalah bagian rimpang Lengkuas putih.

Preparasi Sampel

Pada tahap awal sampel rimpang Lengkuas putih ditimbang dengan berat 2 kg. Selanjutnya dicuci dibawah air mengalir dengan tujuan untuk menghilangkan pengotor. Sampel kemudian dirajam sebelum dikeringkan. Pengeringan sampel dilakukan dengan cara di oven pada suhu 40°C. Selanjutnya sampel diblender hingga menjadi serbuk dan ditimbang. Serbuk yang dihasilkan di ayak dengan ayakan, hingga diperoleh serbuk halus.

Pembuatan Ekstrak

Metode yang digunakan ¹⁰untuk mengekstraksi sampel rimpang Lengkuas putih (*Alpinia galanga* L.Willd) yaitu dengan metode maserasi. Sampel ditimbang sebanyak 150 g, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat. Sampel yang telah ditimbang di ekstraksi dengan 750 mL pelarut etanol 96% pada suhu kamar selama 3 hari sambil sesekali diaduk. Setelah 3 hari sampel disaring

menggunakan kertas saring menghasilkan filtrat satu. Sisa sampel di maserasi kembali dengan 450 mL pelarut etanol 96% selama 2 hari sambil sesekali diaduk kemudian disaring dengan kertas saring dan diperoleh filtrat dua. Sisanya dimaserasi kembali dengan 450 mL pelarut etanol 96% selama 2 hari sambil sesekali diaduk kemudian diperoleh filtrat tiga.³⁴ Filtrat satu, dua dan tiga kemudian dikumpulkan dan diuapkan menggunakan inkubator, sehingga diperoleh ekstrak kental Lengkuas jah. Ekstrak kental yang diperoleh disimpan dalam wadah tertutup dan dimasukkan dalam lemari pendingin.

Sterilisasi Alat

Sebelum alat digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu dengan cara dibungkus menggunakan *aluminium foil* kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf dan disterilisasi selama 15 menit.

Pembuatan Media Dasar dan Media Pemberian

Diambil Nutrient Agar (NA) sebanyak 5,6 g dilarutkan dalam 200 mL aquadest menggunakan erlenmeyer. Setelah itu, media dihomogenkan dengan stirer diatas penangas air sampai mendidih. Media yang sudah homogen ini disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit, kemudian didinginkan sampai suhu ± 45-50°C. Media dasar dan media pemberian digunakan dalam pembuatan media pengujian sebagai lapisan dasar dan lapisan kedua.

Regenerasi Bakteri Uji

Bakteri *Klebsiella pneumoniae* yang akan di ujian harus terlebih dahulu diregenerasikan. Hal pertama yang dilakukan yaitu membuat media miring *nutrient agar* (NA). Media (NA) dituangkan kedalam tabung reaksi kemudian diletakkan pada posisi miring dan di biarkan hingga memadat. Selanjutnya bakteri uji digoreskan ke agar miring *nutrient agar* (NA) dan di inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

Pembuatan Larutan Mc. Farland 0,5 (Standar Kekeruhan)

Larutan H₂SO₄ 1% sebanyak 9,95 mL dicampurkan dengan larutan BaCl₂ .2H₂O 1,175% sebanyak 0,05 mL dalam erlenmeyer. Kemudian dikocok sampai bentuk larutan yang keruh. Kekeruhan ini dipakai sebagai standar kekeruhan suspensi bakteri uji.

Pembuatan Suspensi Bakteri Uji

Bakteri uji *Klebsiella pneumoniae* yang telah diregenerasi diambil dengan jarum ose lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 5 mL larutan NaCl steril 0,9%. Dan suspensi yang telah terbentuk disetarkan kekeruhannya dengan larutan standar McFarland 0,5.

Larutan Uji

Larutan uji dibuat dari hasil ekstraksi yang diperoleh kemudian dienceran menggunakan aquadest sebanyak lima kali pengenceran dengan masing-masing konsentrasi 80%, 60%, 40%, 20% dan 10% dengan menggunakan rumus :

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

Larutan Kontrol Positif

Larutan kontrol positif dibuat dari sediaan obat tablet Ciprofloxacin 500 mg, dengan cara di ambil 1 tablet kemudian digerus dan di timbang seberat 65 mg Selanjutnya di encerkan dalam 50 mL aquadest. Selanjutnya dibuat dengan cara di ambil 1 mL larutan dan ditambahkan aquadest hingga 10 mL untuk memperoleh larutan Ciprofloxacin $5\mu\text{g}/50\mu\text{L}$.

Uji Aktivitas

a. Metode Cakram

Pada pengujian dengan metode cakram, yaitu sebanyak 15 mL media *Nutrient Agar (NA)* dituangkan ke dalam cawan petri dan dibiarkan hingga menjadi padat. Kemudian dimasukkan 1 mL suspensi bakteri *Klebsiella pneumoniae* dan disebarluaskan bakteri dengan menggunakan pipa bentuk L agar suspensi tersebar merata pada media dan diamkan selama 10 menit agar suspensi terserap pada media. Diletakkan kertas cakram Ciprofloxacin (kontrol positif), kertas cakram yang ditetesi larutan CMC (kontrol negatif) dan kertas cakram yang ditetesi larutan uji dengan konsentrasi 80%, 60%, 40%, 20% dan 10% menggunakan pinset steril. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya semua media di inkubasi ke dalam inkubator selama 24 jam pada suhu 37°C. Lalu diukur zona bening yang terbentuk dengan menggunakan penggaris ukuran millimeter.

b. Metode Sumuran

Pada pengujian dengan menggunakan metode sumuran, dibuat dengan 2 lapisan media nutrient agar, yaitu dengan cara :

1. Lapisan dasar dibuat dengan menuangkan masing-masing 10 mL media nutrient agar ke dalam cawan petri kemudian dibiarkan hingga memadat.
2. Lapisan dasar media ditanam 7 pencadang baja dan diatur jaraknya agar daerah pengamatan tidak bertumpu.
3. Suspensi bakteri dicampurkan dalam media nutrient agar
4. Dituangkan 10 mL media nutrient agar pada tiap cawan petri yang diletakkan pencadang sebagai lapisan kedua. Setelah memadat, pancadang diangkat secara aseptik dari masing-masing cawan petri menggunakan pinset steril. Sehingga terbentuk sumur-sumur.
5. Masing-masing lubang sumuran diisi dengan larutan uji, larutan kontrol positif dan larutan kontrol negatif masing-masing 50 μL dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali.
6. Selanjutnya semua media diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam didalam incubator.

Pengukuran Zona Hambat

Pengamatan dilakukan setelah 1x24 jam masa inkubasi. Zona bening merupakan petunjuk kepekaan mikroba terhadap bahan antimikroba yang digunakan sebagai bahan uji

yang dinyatakan dengan lebar diameter zona hambat. Diameter zona hambat diukur kemudian dikategorikan kekuatan daya antibakterinya berdasarkan penggolongan Davis dan Stout (1971).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Sampel

Tanaman Lengkuas Putih (*Alpinia galanga* L. Willd) yang digunakan dalam penelitian ini diidentifikasi ¹⁶ pada bagian taksonomi tumbuhan, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Manado. Tujuan di lakukan identifikasi adalah untuk mengetahui kebenaran dari sampel yang digunakan

Hasil Ekstraksi

Sampel basah rimpang Lengkuas putih sebanyak 2 kg yang dibuat menjadi simplisia dan ekstraksi selama 7 hari dengan menggunakan pelarut etanol 96% menghasilkan filtrat sebanyak 1140 mL. Filtrat yang dihasilkan kemudian di uapkan menggunakan inkubator dengan tujuan menguapkan etanol dari proses maserasi sehingga menghasilkan ekstrak kental rimpang Lengkuas putih sebanyak 9,6 gram. Dari perolehan ekstrak ini, telah dilakukan perhitungan rendemen. Dengan rendemen sampel yang diperoleh yaitu sebesar 7,5%, rendemen ekstrak yang diperoleh yaitu sebesar 0,83% dan rendemen total yang diperoleh yaitu sebesar 6,4%.

Metode Sumuran

Tabel 2. Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat menggunakan Metode Sumuran

Perlakuan	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata
	U1	U2	U3	
K(-)	0	0	0	0
K(+)	9,5	9	9,5	9,3
80%	10	9,5	10	9,8
60%	8,5	9	9,5	9
40%	7	8,5	8	7,8
20%	7,5	7,5	8,75	7,9
10%	7	7,75	8,5	7,7

Uji Aktivitas

11 Metode Cakram

Tabel 1. Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat menggunakan Metode Cakram

Perlakuan	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata
	U1	U2	U3	
K(-)	0	0	0	0
K(+)	11,5	10	10	10,5
80%	11	12	11	11,3
60%	11	10	10	10,3
40%	9	9	10	9,3
20%	7	5	7	6,3
10%	4	2	2	2,6

KESIMPULAN

1. Ekstrak rimpang Lengkuas putih (*Alpinia galanga* L. Willd) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Klebsiella pneumonia*
2. Untuk metode sumuran konsentrasi 80% dan 60% termasuk kategori kuat, konsentrasi 40% dan 20% termasuk kategori sedang dan konsentrasi 10% termasuk dalam kategori lemah. Dalam penelitian ini metode sumuran menghasilkan daya hambat yang lebih baik dibanding dengan metode cakram.

SARJANA

Perlu di lakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai potensi aktivitas antibakteri dari rimpang Lengkuas putih pada jenis bakteri yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliero, A., Aliero, B. L. and Buhari, U. 2008. ²³ Preliminary phytochemical and antibacterial screening of *Scadoxus multiflorus*, *Int. Jor. P. App. Scs.*, **2(4)**:13-17.
- Davis, W. W., T.R. Stout. 1971. Disc plate method of microbiological assay. *Journal of microbiology* **22**: 659-665. ⁶
- Kusriani, R.H., dan Shofia Az Zahra, 2015, Skrining Fitokimia dan Penetapan Kadar Senyawa Fenolik Total Ekstrak Rimpang Lengkuas Merah dan Rimpang Lengkuas Putih (*Alpinia galangal* L.), Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan , Vol. 1, No. 1, Hal. **295-302.** ³⁹
- Puput, H. S. H. 2019. Uji Daya Hambat Ekstrak Rimpang Lengkuas Putih (*Alpinia galanga* (L). Willd) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Klebsiella pneumoniae* Isolat Sputum Pada Penderita Pneumonia Resisten antibiotik Seftriakson. [*Skripsi*]. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam: Universitas Sam Ratulangi Manado. ¹
- Rambiko, C. S., Fatimawali., Bodhi, W. 2016. Uji sensitivitas bakteri penyebab infeksi nosokomial saluran kemih akibat penggunaan kateter terhadap antibiotic ampicillin, ²⁰ oxicillin dan Ciprofloxacin di RSUP Prof.dr.R.D.Kandou ²¹ Manado. *Jurnal Ilmiah Farmasi Pharmacon*.**5(1):1-7.** ²¹
- Sinaga, Ernawati. 2005. *Alpinia galanga* (L) Willd [online]. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan Obat Universitas Nasional/P3TO UNAS. Jakarta Selatan. Tersedia (http://iptekapiji.or.id/artikel/tentangtanaman_obat/unas/lengkuas.pdf) diakses pada tanggal 2 Januari 2013. ⁷
- Sutrisna, E. M. 2012. Penggunaan Antibiotik Secara Rasional. Seminar IDI Girobogan, Purwodadi. ⁷
- Tessy A, Ardayo., Suwanto. 2001. Infeksi salauran kemih dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid 3. Edisi 3. Balai Penerbit FKUI, Jakarta
- Yuharmen, Eryanti, dan Nurbalatif. 2002. *Uji Aktivitas Antimikroba Minyak Atsiri dan Ekstrak Methanol Lengkuas (Lenguas galang)*. Jurusan Kimia, FMIPA. Universitas Riau, Riau. ⁷

Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Rimpang Lengkuas Putih (*Alpinia Galanga* L. Willd) Thdp Bakteri *Klebsiella Pneumoniae* Isolat Urin Pd Penderita Infeksi Saluran Kemih

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | repository.radenintan.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | Ni nyoman Rupiniasih, Indriani, Syamsuddin, Abdul Rahman Razak. "AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI n-HEKSAN, KLOROFORM, ETIL ASETAT BUNGA KAMBOJA (<i>Plumeria alba</i>) TERHADAP BAKTERI <i>Staphylococcus aureus</i> DAN <i>Salmonella typhi</i> ", KOVALEN: Jurnal Riset Kimia, 2019
Publication | 1 % |
| 3 | 99bestteacher.blogspot.com
Internet Source | 1 % |
| 4 | Submitted to Universitas Jenderal Soedirman
Student Paper | 1 % |
| 5 | jurnal.univrab.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | ejournal.unp.ac.id
Internet Source | 1 % |

7	id.scribd.com Internet Source	1 %
8	www.neliti.com Internet Source	1 %
9	www.basisorth.de Internet Source	1 %
10	journal.unhas.ac.id Internet Source	1 %
11	Wahyuddin JUmar din, Masnawati Masnawati. "UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN BINAHONG (<i>Anredera colifolia</i> (Ten.) Steenis) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI <i>Staphylococcus aureus</i> DAN <i>Escherichia coli.</i> ", Jurnal Ilmiah As-Syifaa, 2015 Publication	1 %
12	Nur Afni, Nasrah Said, Yuliet Yuliet. "UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI PASTA GIGI EKSTRAK BIJI PINANG (<i>Areca catechu</i> L.) TERHADAP <i>Streptococcus mutans</i> DAN <i>Staphylococcus aureus</i> ", Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal), 2015 Publication	1 %
13	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
14	simdos.unud.ac.id Internet Source	1 %

15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
17	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	<1 %
19	hasbifaza7.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	kjif.unjani.ac.id Internet Source	<1 %
21	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.lifesciencesite.com Internet Source	<1 %
24	ejurnalmalahayati.ac.id Internet Source	<1 %
25	prosiding.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
26	repositori.umsu.ac.id	

<1 %

-
- 27 Dede Sukandar, Sandra Hermanto, Eka Rizki Amelia, Muhamad Zaenudin. "AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK BIJI KAPULAGA (*Amomum compactum Sol. Ex Maton*)", Jurnal Kimia Terapan Indonesia, 2016
Publication <1 %
-
- 28 ejurnal.setiabudi.ac.id Internet Source <1 %
-
- 29 jurnal.untad.ac.id Internet Source <1 %
-
- 30 repository.unsri.ac.id Internet Source <1 %
-
- 31 Herwin Herwin, Firna Anggriani Mile. "AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BATANG *Phytocrene macrophylla BLUME*", Jurnal Ilmiah As-Syifaa, 2017
Publication <1 %
-
- 32 ibu.sehati.co Internet Source <1 %
-
- 33 perpusnwu.web.id Internet Source <1 %
-
- 34 A. Mumtihanah Mursyid. "UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA EKSTRAK DIETIL ETER AKAR ANTING-ANTING (*Acalypha australis L.*) <1 %

SECARA KLT-BIOAUTOGRAFI", Jurnal Ilmiah As-Syifaa, 2012

Publication

-
- 35 Henaldy Parengkuan, Vonny N. S. Wowor, Damajanty H. C. Pangemanan. "Uji Daya Hambat Ekstrak Bunga Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis L.*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Streptococcus mutans*", e-GiGi, 2020 **<1 %**
Publication
-
- 36 Riski Kurniawan. "INKRUHEDAMASEDA (Inovasi Krupuk Herbal Daun Manggis Sebagai Antioksidan untuk Mewujudkan Ekonomi Negri)", Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian, 2020 **<1 %**
Publication
-
- 37 repositori.uin-alauddin.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 38 Asiska Permata Dewi, Yulia Yesti. "PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK MENJADI KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN SERTA UJI BIODEGRADASINYA", JOPS (Journal Of Pharmacy and Science), 2018 **<1 %**
Publication
-
- 39 etheses.uin-malang.ac.id **<1 %**
Internet Source

40

Adityawarman Adityawarman, Mahyarudin
Mahyarudin, Effiana Effiana. "Isolasi,
Identifikasi dan Aktivitas Antibakteri Bakteri
Endofit Daun Pegagan (*Centella asiatica L.*)
terhadap *Escherichia coli*", Jurnal Cerebellum,
2019

<1 %

Publication

41

qdoc.tips
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On