

Patogenisitas *Metarhizium huainamdangense* Isolat Dumoga Timur Terhadap Wereng Batang Coklat (*Nilaparvata lugens*) Pada Tanaman Padi Sawah

by Dantje Tarore 07

Submission date: 29-Aug-2022 09:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 1888514833

File name: arhizium_huainamdangense_Isolat_Dumoga_Timur_Terhadap_Wereng.pdf (881.79K)

Word count: 2695

Character count: 16547

Patogenisitas *Metarhizium huainamdangense* Isolat Dumoga Timur Terhadap Wereng Batang Coklat (*Nilaparvata lugens*) Pada Tanaman Padi Sawah

(Pathogenicity Of Metarhizium huainamdangense Isolates From Dumoga, Bolaang Mongondow District Against Brown Planthopper (Nilaparvata lugens) In Paddy Fields)

Jusak Wongkar^{1,2)*}, Santje Tarore¹⁾, Jimmy Rimbing¹⁾

¹⁾ Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPMTPH) Provinsi Sulawesi Utara

²⁾ Program Studi Entomologi Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Email korespondensi: jusaknwongkar@gmail.com

(Article History: Received Dec 20, 2021; Revised Jan 20, 2022; Accepted Feb 2, 2022)

ABSTRAK

Wereng coklat telah dilaporkan resisten terhadap berbagai jenis insektisida. Salah satu pengendalian yang ramah lingkungan, yaitu dengan penggunaan jamur entomopatogen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan jamur entomopatogen *M. huainamdangense* isolat lokal terhadap wereng coklat. Pengujian patogenisitas isolat lokal *M. huainamdangense* menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan yaitu perlakuan K1 (Kerapatan 10⁶), K2 (Kerapatan 10⁷), K3 (Kerapatan 10⁸), K4 (Kerapatan 10⁹) dan K0 sebagai kontrol. Setiap perlakuan diulang 5 (lima) kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan K4 yang paling cepat mematikan serangga hingga 100% yaitu pada perlakuan K4 (Kerapatan 10⁹). Hasil analisis probit menunjukkan nilai LT50 pada perlakuan kerapatan konidium 10⁹ (K4) yaitu pada 1,6 hari, sedangkan nilai LC50 menunjukkan konsentrasi 10^{8,9} konidium/ml pada hari kedua. Penggunaan konsentrasi kerapatan konidia yang lebih rendah mampu mematikan 50% serangga dalam waktu yang lebih lama.

Kata kunci: *Metarhizium huainamdangense*; entomopatogen; *Nilaparvata lugens*

ABSTRACT

Brown planthoppers have been reported to be resistant to various types insecticides. One of the environmentally friendly controls is the use of entomopathogenic fungi. This study aims to test the effectiveness of the entomopathogenic fungus *M. huainamdangense* local isolate against brown planthoppers. Pathogenicity testing of local isolates of *M. huainamdangense* used a completely randomized design (CRD) with five treatments, namely K1 (Density 10⁶), K2 (Density 10⁷), K3 (Density 10⁸), K4 (Density 10⁹) and K0 as control. Each treatment was repeated 5 (five) times. The results showed that the fastest treatment to kill insects up to 100% was in the K4 treatment (density 10⁹). The results of the probit analysis showed the LT50 value in the conidium density treatment 10⁹ (K4) at 1.6 days. Meanwhile, the LC50 value showed a concentration of 10^{8,9} conidium/ml on the second day. The use of a lower concentration of conidia density was able to kill 50% of insects in a longer time.

Keywords: *Metarhizium huainamdangense*; entomopathogen; *Nilaparvata lugens*

PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas penting dalam pemenuhan konsumsi beras bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Padi adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat yang cukup bagi tubuh manusia, sebab di dalamnya terkandung bahan yang mudah diubah menjadi energi (Anonim 2011; Kurnianti

2013). Padi dibudidayakan dengan tujuan mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya dengan kualitas sebaik mungkin, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan maka tanaman yang akan ditanam harus sehat dan subur.

Tanaman yang sehat ialah tanaman yang tidak terserang oleh hama dan penyakit, tidak mengalami defisiensi hara, baik unsur

hara yang diperlukan dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Hampir di setiap musim terjadi ledakan hama pada pertanaman padi. Hama utama tanaman padi antara lain adalah tikus, penggerek batang padi, dan wereng batang coklat. Wereng batang coklat (*Nilaparvata lugens*) merupakan hama yang sangat merugikan perpadian di Indonesia, dengan serangannya yang dapat menyebabkan puso pada areal yang luas dalam waktu yang singkat. Hama ini mudah beradaptasi membentuk biotipe baru dan dapat mentransfer virus kerdil hampa dan virus kerdil rumput yang daya rusaknya lebih hebat dari hama wereng batang coklat itu sendiri (Tandiabang et al. 2001; IRR 2003; Widiarta et al. 2004).

Pengendalian wereng batang coklat oleh petani biasanya menggunakan insektisida, namun jika digunakan secara berlebihan maka akan menimbulkan dampak negatif seperti resistensi, resurgensi, dan eksplosi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu alternatif pengendalian yang relatif lebih aman, baik bagi musuh alami, petani, produk yang dihasilkan, serta lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan agens hayati diharapkan menggunakan dan juga dapat mengembangkan musuh alami yang spesifik lokasi. Pengendalian hayati dengan memanfaatkan jamur entomopatogen berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu jenis jamur entomopatogenik yang terbukti cukup efektif mengendalikan hama wereng batang coklat adalah jamur *Metarhizium anisopliae*, jamur ini telah banyak digunakan di berbagai tempat di Indonesia. Secara alami di Dumoga Timur juga terdapat jamur entomopatogen akan tetapi baru-baru ini diketahui bahwa spesiesnya berbeda dengan *Metarhizium* di daerah lain. Berdasarkan hasil uji genetik yang dilakukan oleh Jusak et al. (2021) terhadap jamur yang diisolasi dari wereng batang coklat ternyata jamur tersebut adalah spesies *M. Huainamdangense*. Spesies ini belum pernah dilaporkan ditemukan di Indonesia namun spesies ini pernah ditemukan di Thailand. Sampai saat ini belum ada laporan tentang kemampuan jamur *M.*

huainamdangense terhadap wereng batang coklat (*N. lugens*) terutama dari daerah Dumoga Timur, karena jamur ini merupakan isolat lokal yang spesifik. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis patogenisitas dari jamur *M. huainamdangense* terhadap wereng batang coklat (*N. lugens*) pada tanaman padi sawah.

11 METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021. Eksplorasi jamur dilakukan di pertanaman padi sawah di desa Kembang Sari Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Kemudian penelitian dilanjutkan pada tahap isolasi, identifikasi, dan uji patogenisitas di Laboratorium Agens Hayati, Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPMTPH) Provinsi Sulawesi Utara.

Alat dan Bahan

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih tanaman padi, imago *Nilaparvata lugens*, beras, *Potato Dextrose Agar* (PDA), alkohol 70 %, *chloramphenicol* 250 mg, tissue, aquades steril, *haemocytometer*, *colony counter*, jarum ose, *petridish*, *object glass*, *deck glass*, tabung reaksi, aspirator, gelas ukur, autoclave, plastik, mikroskop, jet sprayer dan alat-tulis menulis.

Prosedur Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 (empat perlakuan) yaitu:

k0 : 0 (kontrol, hanya air, tanpa pemberian konidium)

k1 : 10^6 konidium/ml

k2 : 10^7 konidium/ml

k3 : 10^8 konidium/ml

k4 : 10^9 konidium/ml

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 (lima) dan tiap ulangan terdiri

dari 50 serangga yang diletakkan pada tiap ember yang berbeda.

Isolasi dan Perbanyakkan Jamur *M. huainamdangense*

Jamur yang ada di permukaan tubuh serangga diambil dengan jarum ose dan dibiakan pada media PDA (*Potato Dextrose Agar*) hingga murni, yang selanjutnya diidentifikasi molekuler PCR dengan hasil yang didapatkan yaitu 99,65% mirip dengan spesies *M. huainamdangense*. Isolat jamur yang telah murni selanjutnya dilakukan perbanyakkan massal jamur *M. huainamdangense* dengan menumbuhkan konidia jamur pada media beras. Inokulasi jamur dilakukan dengan cara mengambil kira-kira 1 cm² konidia dan miselia pada PDA (hasil isolasi dan identifikasi) dan menginokulasikannya pada permukaan media beras, kemudian diinkubasikan pada suhu kamar selama 21 hari, sampai seluruh bagian permukaan media beras ditumbuhi miselia dan konidia jamur (ISO 2015).

Pembuatan Suspensi Uji dan Penghitungan Kerapatan Konidia

Konidia jamur yang telah tumbuh pada media beras diambil, kemudian dikocok ke dalam 100 ml air sehingga menghasilkan suspensi jamur *M. huainamdangense*. Suspensi jamur *M. huainamdangense* diencerkan secara bertingkat untuk mendapatkan empat konsentrasi suspensi uji yaitu 10⁶, 10⁷, 10⁸, dan 10⁹ konidia/ml. Penghitungan jumlah konidia dilakukan dengan cara meniskan suspensi konidia haemocytometer dan diamati di bawah mikroskop compound dengan perbesaran 400 kali.

Penyediaan Serangga Uji dan Uji Patogenisitas Jamur

Nimfa dan nago *N. lugens* diambil pada pertanaman padi sawah di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan cara menggunakan aspirator kemudian serangga dipelihara dan diperbanyak di dalam kurungan kasa berukuran 50 cm x 50 cm x 70 cm.

Serangga uji yang telah berumur 18-20 hari dipilih yang sehat sebanyak 50 ekor untuk tiap ulangan perlakuan dan ditempatkan pada kotak kurungan kasa uji patogenisitas yang di dalamnya terdapat tanaman padi yang ditumbuhkan pada wadah ember plastik. Selanjutnya serangga uji yang ada diaplikasikan dengan suspensi jamur *M. huainamdangense* dengan cara menyemprotkan sebanyak lima kali untuk tiap ulangan dengan menggunakan jet sprayer. Kemudian dilakukan pengamatan mortalitas serangga uji setiap hari dimulai dari satu hari setelah aplikasi sampai mencapai persentase mortalitas 100%.

Analisis Data

Analisis data untuk pengamatan morfologi dengan cara mendeskripsikan ciri-ciri morfologinya dan menghitung kerapatan spora dengan rumus:

$$S = \frac{\bar{X}}{L \times t \times d} \times 10^3$$

Keterangan :

S = kerapatan konidium/ml

\bar{X} = rerata jumlah konidium pada kotak a,b,c,d,e

L = luas kotak hitung 0,04 mm²

t = kedalaman bidang hitung 0,1 mm

d = faktor pengenceran

10³ = volume suspensi yang dihitung (1 ml = 10³ mm³)


Untuk mencari nilai *Lethal Concentration 50* (LC50) dan *Lethal Time 50* (LT50) dihitung menggunakan analisis probit dengan menggunakan program aplikasi *microsoft excel*. Data hasil uji patogenisitas dianalisis dengan Uji Anava pada taraf 95% dan akan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil pada taraf kepercayaan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mortalitas

Pada Gambar 1 dapat dilihat rata-rata mortalitas dari wereng batang coklat (*N. lugens*) setelah diaplikasikan beberapa perlakuan isolat jamur *M.*

huainamdangense, yang menunjukkan adanya perbedaan mortalitas dari satu hari setelah perlakuan (HSP) sampai tujuh HSP. Pada satu HSP perlakuan dengan kerapatan konidium 10^8 (K3) dan 10^9 (K4) sudah mampu menyebabkan kematian lebih dari 25% dibandingkan dengan perlakuan kerapatan konidium 10^6 (K1) dan 10^7 (K2) yang pada satu HSP hanya mampu menyebabkan kematian kurang dari 25%. Pada ketiga HSP juga dapat dilihat adanya perbedaan yang jauh antar tiap perlakuan, yang dimana perlakuan dengan kerapatan konidium 10^9 (K4) mortalitasnya sudah mencapai lebih dari 80%, berbeda dengan perlakuan kerapatan konidium 10^7 (K3) dan 10^8 (K4) yang pada tiga HSP mampu menyebabkan kematian lebih dari 70%. Sedangkan untuk perlakuan kerapatan konidium 10^6 (K1) pada tiga HSP hanya mampu mematikan serangga 48%.



Gambar 1. Grafik persentase mortalitas wereng batang coklat (*N. lugens*) setelah aplikasi beberapa isolat *M. huainamdangense*.

Perbedaan mortalitas ini diduga terjadi akibat tingkat kerapatan konidium yang lebih tinggi sehingga memicu mortalitas dari serangga hama wereng batang coklat (*N. lugens*) semakin cepat, dibanding³¹n dengan tingkat kerapatan konidium yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soetopo (2004) yang menunjukkan bahwa viabilitas spora jamur yang tinggi menyebabkan mortalitas serangga yang tinggi. Berdasarkan hasil mortalitas yang ada, menunjukkan bahwa dengan hanya membutuhkan waktu enam sampai tujuh hari sudah mampu mematikan 90-100% serangga. Zakharia 2019 melaporkan bahwa *M. anisopliae* paling efektif mematikan

wereng batang coklat pada konsentrasi 1 g/100 ml dengan tingkat mortalitas 67,5%. Perbedaan mortalitas dapat disebabkan oleh pengaruh kondisi konidia dan virulensi suatu jamur (Dumas et al. 1996).

Lethal Time 50 (LT50) dan Lethal Concentration 50 (LC50)

Hasil uji patogenisitas dari jamur entomopatogen *M. huainamdangense* berdasarkan nilai LT₅₀ dan LC₅₀ dapat dilihat pada tabel 1. Hasil analisis probit menunjukkan nilai LT₅₀ pada perlakuan kerapatan konidium 10^6 (K1), 10^7 (K2), 10^8 (K3), dan 10^9 (K4) secara berturut-turut yaitu 2,3 hari; 1,9 hari; 1,7 hari; dan 1,6 hari. Berdasarkan nilai LT₅₀ yang ada, perlakuan dengan kerapatan konidium 10^9 konidium/ml lebih cepat mematikan 50% serangga yaitu h¹⁷ya membutuhkan waktu selama 1,6 hari (Tabel 1). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan waktu yang sangat jauh antara masing-masing konsentrasi kerapatan konidium yaitu hanya berkisar satu sampai dua hari. Hal ini dipengaruhi oleh sifat bawaan strain isolat dan juga viabilitas spora isolat (Herlinda et al. 2008).

Tabel 1. Nilai LT₅₀ dan LC₅₀ perlakuan isolat *M. huainamdangense* pada Wereng batang coklat (*N. lugens*)

Serangga	Konsentrasi	LT ₅₀ (Hari)	LC ₅₀ (Konidium/ml)
<i>N. lugens</i>	1×10^6	2,3	
	1×10^7	1,9	8,9
	1×10^8	1,7	
	1×10^9	1,6	

Patogenisitas dari suatu entomopatogen juga dapat dilihat dari nilai LC₅₀. Berdasarkan hasil analisis probit pada tabel 1, konsentrasi kerapatan konidium yang dapat mematikan 50% serangga yaitu pada konsentrasi $10^{8,9}$ konidium/ml pada hari kedua. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mematikan 50% serangga membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi dari penggunaan isolat lokal ini. Menurut Untung (2010), konsentrasi kerapatan konidia yang tinggi dapat berpotensi bagi konidia untuk melakukan penetrasi ke dalam tubuh


serangga dan membentuk blastospora yang lebih banyak sehingga akan menyebar lebih cepat dan mengakibatkan serangga mati. Penggunaan konsentrasi kerapatan konidia yang lebih rendah mampu mematikan 50% serangga tetapi dalam waktu yang lebih lama, hal ini disebabkan oleh karena kerapatan konidia yang sedikit sehingga waktu infeksi menjadi lebih lama.

Persentase Mortalitas Pada Hari Kedua


Hasil analisis rata-rata persentase mortalitas wereng batang coklat (*N. lugens*) pada hari kedua menunjukkan adanya perbedaan pada mortalitas (Gambar 2). Perlakuan kerapatan konidium 10^6 (K1) tidak berbeda nyata dengan konsentrasi kerapatan konidium 10^7 (K2) dan 10^8 (K3), tetapi sangat berbeda nyata dengan kontrol (K0). Sedangkan perlakuan kerapatan konidium 10^8 (K3) tidak berbeda nyata dengan kerapatan konidium 10^9 (K4), tetapi kerapatan konidium 10^9 (K4) berbeda nyata dengan perlakuan kerapatan konidium lainnya yaitu K1, K2, K3, dan K0. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, menunjukkan bahwa semakin tinggi kerapatan konidia maka semakin tinggi juga tingkat mortalitas yang didapat. Hal ini terlihat dari besarnya perbedaan mortalitas yang tinggi antara kerapatan konidia paling tinggi yaitu 10^9 konidium/ml dengan kerapatan konidia paling rendah yaitu 10^6 konidium/ml.

Kematian dari serangga hama wereng batang coklat (*N. lugens*) hanya membutuhkan waktu enam hari untuk mematikan 100% serangga. Namun, pada waktu serangga mati pada satu HSP belum terlihat adanya ciri-ciri pertumbuhan jamur seperti tumbuhnya miselium jamur *M. huainamdangense*. Miselium dari jamur *M. huainamdangense* pertama kali muncul pada hari keempat dengan memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih pada tahap vegetatif, yang lama-kelamaan akan berubah menjadi warna hijau pucat pada tahap generatif dan pertumbuhan miselium terlihat hampir pada seluruh permukaan tubuh serangga yaitu pada bagian kepala, sayap, dan abdomen (gambar 3). Hal ini sesuai dengan

penelitian yang telah dilaporkan oleh Suryadi dan Kadir (2007) yang menyatakan bahwa tubuh serangga wereng batang coklat yang terinfeksi memiliki ciri-ciri miselium yang berwarna kehijau-hijauan dan sebaran kondisinya tidak merata.



Gambar 2. Hasil analisis terhadap persentase kematian pada hari kedua. Huruf kecil yang sama di atas bar menunjukkan tidak berbeda nyata berdasar uji BNT pada α 5%.



Gambar 3. Wereng batang coklat (*N. lugens*) yang dikolonisasi miselium jamur *M. huainamdangense*.

KESIMPULAN

Jamur entomopatogen isolat Dumoga Timur yang menyerang wereng batang coklat (*N. Lugens*) merupakan jamur *M. huainamdangense*. Konsentrasi kerapatan konidium 10^9 konidium/ml sudah dapat menyebabkan mortalitas 100% wereng batang coklat (*N. lugens*) pada hari kelima. Nilai LT_{50} yaitu hanya membutuhkan waktu dua hari, sedangkan untuk nilai LC_{50} pada konsentrasi $10^{8,5}$ konidium/ml. Hasil analisis rata-rata persentase mortalitas wereng batang coklat (*N. lugens*) yang dilakukan pada hari kedua HSP dengan menggunakan uji anava menunjukkan adanya perbedaan pada mortalitas tiap perlakuan. Perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut jamur *M. huainamdangense* di laboratorium sebagai agens pengendali hayati wereng batang coklat (*N. lugens*) pada tanaman padi sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2011). <http://cenHama Padi: Wereng dan Cara Penanggulangannya. tongkaleng.wordpress.com/2011/08/05/hama-padi-wereng/>
- Dumas, CM. R, V Matha and A Vey (1996). Comparative study of the cytological aspects of the mode of action of destruxions and other peptidic fungal metabolites on target epithelial cells. *J. Invert. Pathol.* 67,137-146.
- Herlinda S, Mulyati SI, Suwandi (2008). Jamur Entomopatogen Berformulasi Cair sebagai Bioinsektisida untuk Pengendali Wereng Coklat. *Agritrop* 27(3):119-126.
- IRRI (International Rice Research Institute) (2003). Masalah Lapang Hama, Penyakit, Hara pada Padi. IRRI. 71 hal.
- ISO. 2015. *Sistem Manajemen Mutu*. Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura Laboratorium Agens Hayati (LAH) Kalasey
- Kurnianti N (2013). Budidaya Tanaman Padi Sawah. <http://petunjukbudidaya.blogspot.com/2013/01/budidaya-tanaman-padi-sawah.html>
- Soetopo D (2004). Efficacy of selected *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. isolates in combination with a resistant cotton variety (PSB-Ct 9) against the cotton bollworm, *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). [Disertasi]. Philippines: University of The Philippines Los Banos.
- Zhakaria M.F. (2019) Uji Efektivitas Jamur Entomopatogen *Metarhizium anisopliae* Formulasi Tepung terhadap Wereng Coklat *Nilaparvata lugens* Stal (Homoptera: Delphacidae) pada Tanaman Padi. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jember.
- Suryadi Y, dan Kadir TS (2007). Pengamatan Infeksi Jamur Patogen Serangga *Metarhizium anisopliae* (Metsch. Sorokin) Pada Wereng Coklat. *Berita Biologi* 8(6): 501-507.
- Tandiabang, J., Koesnang & A. Muis (2001). Fluktuasi populasi wereng hijau (*Nephotettix virescens*) dan intensitas penyakit tungro di Lanrang, Sidrap, Sulawesi Selatan. *J. Fitopat. Ind.* 5:24-29.
- Widiarta IN, Kusdianan D, Siwi SS, & Hasanuddin A (2004). Variasi efikasi penularan tungro oleh koloni-koloni wereng hijau *Nephotettix virescens* Distant. *J. Entomol. Ind.* 1:50-56.
- Untung K (2000). Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Patogenisitas Metarhizium huainamdangense Isolat Dumoga Timur Terhadap Wereng Batang Coklat (Nilaparvata lugens) Pada Tanaman Padi Sawah

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	1%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
3	Widya Sari & Yana Muhammad Yasin. "RESPON PERTUMBUHAN BIBIT PADI PANDANWANGI (Oryza sativa L. Aromatic) TERHADAP LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI RIZOBAKTERIA PEMACU PERTUMBUHAN TANAMAN (RPPT)", AGROSCIENCE (AGSCI), 2018 Publication	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	www.coursehero.com Internet Source	1%
6	laporanakhirskripsitesisdisertasimakalah.wordpress.com Internet Source	1%

7	es.scribd.com Internet Source	1 %
8	Susan SCA Wowiling, J Pelealu, R TD Maramis. "Pemanfaatan Cendawan Beauveria bassiana dalam Mengendalikan Hama Paraeucosmetus sp. Pada Tanaman Padi Sawah di Kabupaten Minahasa Selatan (The Use of Endophytic Fungi Beauveria bassiana to Control Paraeucosmetus sp. on Rice Plant in South Minahasa Dist", JURNAL BIOS LOGOS, 2015 Publication	1 %
9	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1 %
10	Mohammad Akhbar Yassin, Nur Rochman, Setyono Setyono. "Kemangkusan Metarhizium anisoplae dan Beauveria bassiana sebagai Bioinsektisida bagi Hama Gudang Sitophilus oryzae", JURNAL AGRONIDA, 2020 Publication	1 %
11	e-journal.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
12	www.faperta.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
13	Marsela Maria Manopo, Caroulus S. Rante, Reity A.G. Engka, Tommy B. Ogie. "TYPES AND	<1 %

POPULATIONS OF INSECT PESTS IN RICE
FIELDS (*Oryza Sativa* L.) IN MOGOYUNGGUNG
VILLAGE, DUMOGA TIMUR DISTRICT,
BOLAANG MONGONDOW REGENCY.", Jurnal
Agroekoteknologi Terapan, 2021

Publication

14

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

15

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

16

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

17

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

18

adoc.pub

Internet Source

<1 %

19

eprints.ipdn.ac.id

Internet Source

<1 %

20

jurnal.fp.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

21

www.tiket2.com

Internet Source

<1 %

22

ayyubicctv.com

Internet Source

<1 %

23

biodiversitas.mipa.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

24

journals.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

25

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

26

ojs.uho.ac.id

Internet Source

<1 %

27

repo.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

28

. Reflis, M. Nurung, Juliana Dewi Pratiwi.
"MOTIVASI PETANI DALAM
MEMPERTAHANKAN SISTEM TRADISIONAL
PADA USAHATANI PADI SAWAH DI DESA
PARBAJU JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROPINSI SUMATERA UTARA", Jurnal AGRISEP,
2011

Publication

<1 %

29

Rosma Hasibuan, Dewi Retnosari, Nur Yasin,
Purnomo Purnomo, Lestari Wibowo.
"PENGARUH BEBERAPA TEKNIK
PENGENDALIAN TERHADAP POPULASI
WERENG JAGUNG DI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN", Jurnal
Agrotek Tropika, 2021

Publication

<1 %

30	ejurnal.litbang.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
31	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
32	peternakan.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
33	Dona Cindy Elfira Rana, Sedy Rondonuwu, Roni Koneri. "Pemberian Ekstrak Daun Kiara Payung (<i>Filicium decipiens</i> (Wight dan Arn.) Thwaites) sebagai Bioherbisida terhadap Pertumbuhan Gulma Babadotan (<i>Ageratum conyzoides</i> L.)", <i>JURNAL BIOS LOGOS</i> , 2020 Publication	<1 %
34	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
35	Suriani Suriani, Fikrinda Fikrinda, Marlina Marlina. "PENGENDALIAN PENYAKIT BLAS (<i>Pyricularia oryzae</i>) PADA BEBERAPA VARIETAS PADI GOGO MENGGUNAKAN MIKORIZA INDIGENOUS DAN NON INDIGENOUS", <i>Jurnal Agroecotania : Publikasi Nasional Ilmu Budidaya Pertanian</i> , 2018 Publication	<1 %

Exclude bibliography On